


Los datos de control del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) de la Ciudad de Nueva York se utilizan para planificar e implementar iniciativas de prevención, pruebas y tratamiento del VIH a fin de mejorar la salud de los neoyorquinos. En 2024, la cantidad de personas recientemente diagnosticadas con VIH (1791) aumentó en un 5.4 % desde 2023. Los datos que muestran aumentos y desigualdades en los nuevos diagnósticos y la incidencia estimada destacan la necesidad de una respuesta de salud pública sostenida, e incluso acelerada, al VIH.


VIH en la Ciudad de Nueva York en 2024

En 2024, **1791** personas fueron diagnosticadas recientemente con VIH en la Ciudad de Nueva York, un aumento del **5.4 %** con respecto a 2023.

Proporción de personas recientemente diagnosticadas con VIH en la Ciudad de Nueva York según raza y origen étnico



Proporción de la población de la Ciudad de Nueva York según raza y origen étnico



El 85 % de las personas que recibieron un diagnóstico reciente de VIH eran negras o latinas¹; sin embargo, estos grupos representaban solo el 50 % de la población de la Ciudad de Nueva York.

Entre las **personas recientemente diagnosticadas con VIH**:

El 75 % eran hombres

El 20 % eran mujeres

El 4 % eran mujeres transgénero

<1 % eran hombres transgénero

<1 % tenían otras identidades de género²

El 66 % tenía entre **20 y 39** años

De 0 a 12 **<1 %**

De 13 a 19 **3 %**


De 20 a 29 **34 %**

De 30 a 39 **32 %**


De 40 a 49 **16 %**

De 50 a 59 **9 %**

Más de 60 **7 %**



El 96 % probablemente contrajo el VIH a través del **contacto sexual** y el **3 %** informó **antecedentes de consumo de drogas inyectables^{3,4}**



El 65 % eran **hombres que tienen relaciones sexuales con hombres^{3,4}**

Se estima que **91 300** personas con VIH vivían en la Ciudad de Nueva York en 2024.

De cada 100 personas con VIH en la Ciudad de Nueva York:

94 recibieron un diagnóstico

87 recibieron atención médica por VIH

83 recibieron recetas de medicamentos para tratar el VIH

81 indicaron supresión viral

La **supresión viral⁵** entre las personas con VIH varió según la raza y el origen étnico¹.

Negros 77 %

Latinos 81 %

Blancos 89 %

Asiáticos o nativos de las Islas del Pacífico 83 %

Nativos estadounidenses 76 %

Multirracial 74 %

En la Ciudad de Nueva York hay información y recursos disponibles sobre la prevención, las pruebas y el tratamiento del VIH.

Prevención

Además del uso de condones y otros métodos de barrera, hay medicamentos seguros y eficaces que cualquier persona puede tomar para prevenir el VIH.

- La profilaxis previa a la exposición (pre-exposure prophylaxis, PrEP) previene el VIH de antemano.
- La profilaxis posexposición (post-exposure prophylaxis, PEP) es un medicamento de emergencia que puede prevenir una nueva infección por VIH si se toma pronto después de una exposición.

Pruebas

Para encontrar servicios de pruebas de detección de VIH gratuitos o de bajo costo cerca de usted puede hacer lo siguiente:

- Visitar una clínica de bienestar sexual de la Ciudad de Nueva York, donde cualquier persona mayor de 12 años puede hacerse una prueba confidencial y anónima: nyc.gov/sexualhealthclinics
- Buscar en NYC Health Map: nyc.gov/health/map.
- Enviar un mensaje de texto con la palabra "TESTNYC" al 55676.
- Llamar al **311**.
- Para obtener ayuda con notificaciones de parejas, llame al **311**.

Tratamiento

Los medicamentos para tratar el VIH son seguros y más efectivos que nunca.

- Indetectable = Intransmisible (Undetectable = Untransmittable, U=U): Las personas con VIH que reciben tratamiento y mantienen una carga viral indetectable no pueden transmitir el VIH a través de las relaciones sexuales.

Nota: Datos informados al Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York al 31 de marzo de 2025. Para obtener información sobre los datos y las definiciones, y para leer el Informe anual de control del VIH completo de 2024, visite nyc.gov/hivreports.

¹ Las categorías de raza excluyen el origen étnico latino; las personas con origen étnico latino se agrupan en la categoría Latinos independientemente de la clasificación de su raza. ² Las otras identidades de género incluyen no binario, género queer, género no conforme y cualquier otra identidad de género no mencionada anteriormente. Las identidades de género se basan en datos limitados de control del VIH y se enumeran sin ninguna jerarquía ni prioridad intencionada. ³ Los porcentajes excluyen a las personas con información de transmisión desconocida (n = 582). ⁴ Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres no incluyen a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y tienen antecedentes de consumo de drogas inyectables.

⁵ Se consideraron personas con supresión viral aquellas que tuvieron una carga viral indetectable (una carga viral menor que 200 copias por mililitro) en su última prueba en 2024.



Para obtener más información y recursos sobre el VIH en la Ciudad de Nueva York, escanee el código QR o visite nyc.gov/health/hiv.
Para obtener más información y recursos sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS), visite nyc.gov/sti.

10.25 Spanish

