

لقاح JYNNEOS لعلاج Mpox: الأسئلة الشائعة

يوصى بلقاح JYNNEOS للأشخاص الذين أصيبوا مؤخرًا بفيروس Mpox (الذي أشير إليه سابقًا بفيروس جدري القروذ) أو تحتل إصابتهم به مستقبلًا.

ما مدى فعالية لقاح JYNNEOS؟

اعتمد لقاح JYNNEOS للوقاية من فيروس Mpox والجدري. ويحتوي هذا اللقاح على الوَؤس، وهو فيروس مرتبط بفيروس Mpox وفيروس الجدري، وقد تم إضعافه، ولا يمكنه التكاثر في الخلايا البشرية، كما لا يمكنه الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم أو إلى شخص آخر. ولا يمكن للقاح أن يسبب فيروس Mpox أو الجدري أو فيروس الوَؤس للشخص الذي يتلقاه أو المحيطين به.

طريقة إعطاء اللقاح

يمكن إعطاء اللقاح تحت الجلد أو داخله حسب رغبة المريض أو مقدم الرعاية. وفي كلتا الطريقتين، يلزم أخذ حقنة، وعادةً ما تكون في الذراع. ويمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا تلقي اللقاح تحت الجلد فقط. للمزيد من المعلومات عن تلقي لقاح JYNNEOS داخل الجلد، تفضل بزيارة on.nyc.gov/jynneos-intradermal-ar.

ما الآثار الجانبية الشائعة للقاح؟

يمكن أن يشعر الأشخاص بالتعب والصداع وآلام العضلات بعد تلقي اللقاح. وقد يعانون أيضًا من احمرار وتورم وألم وحكة في موضع الحقن، وهذه الآثار أكثر شيوعًا مع الحقن داخل الجلد، وقد تسوء بل وتستمر لفترة زمنية أطول.

كم جرعة أحتاج إليها؟

يجب أن تحصل على جرعتين بفواصل أربعة أسابيع على الأقل بينهما. سيبدأ جسمك في تكوين مناعة بعد الجرعة الأولى، لكن لن تكتمل مناعته من اللقاح إلا بعد مرور أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية.

ما مدى فعالية اللقاح؟

تظهر البيانات الأولية أن لقاح JYNNEOS قد ساعد على الوقاية من فيروس Mpox المتفشى حاليًا، لكن يلزم إجراء المزيد من الدراسات لفهم مدى فعاليته. من الضروري الاستمرار في اتخاذ تدابير وقائية أخرى، مثل تجنب ممارسة الجنس مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس Mpox.

ماذا أفعل إذا عانيت من مشكلة صحية خطيرة بعد تلقي اللقاح؟

تشمل علامات رد الفعل التحسسي الشديد حساسية الجلد وتورم الوجه والحلق وصعوبة التنفس وسرعة ضربات القلب والدوخة والضعف. وإذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي شديد، فاتصل برقم 911 أو توجه إلى المستشفى. ويمكنك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الذي تتعامل معه إذا ظهرت عليك آثار جانبية أخرى تقلقك، أو الاتصال برقم 311 كي يتم توصيلك بالرعاية. ويجب على مقدم الرعاية الذي تتعامل معه إعلام نظام الإبلاغ عن الآثار العكسية للقاح (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) بردود الفعل العكسية الشديدة، ويمكنك أيضًا الإبلاغ على الموقع الإلكتروني vaers.hhs.gov أو من خلال الاتصال بالرقم 800-822-7967. ويُرجى العلم أن الموظفين لدى نظام VAERS لا يقدمون استشارة طبية.

هل يمكن للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة أو أي أمراض جلدية تلقي اللقاح؟

نعم، أجريت دراسة عن لقاح JYNNEOS على الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الجلد التأتبي (الإكزيما)، ولم يُكشف عن أي ردود فعل عكسية شديدة. قد يعاني المصابون بهذه الحالات أو بضعف جهاز المناعة من مرض أكثر شدة إذا أصيبوا بفيروس Mpox، لذا من المهم تطعيمهم في حال احتمالية إصابتهم. ومع ذلك قد تقل احتمالية تكوين استجابة مناعية فعالة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بعد تلقيهم اللقاح، لذا يلزم الاستمرار في اتخاذ تدابير وقائية أخرى حتى بعد تلقي اللقاح.

هل يمكن للأشخاص الذين يعانون من أي من أمراض القلب تلقي اللقاح؟

لم تظهر التجارب السريرية زيادة احتمالية الإصابة بالتهاب عضلة القلب (التهاب القلب) بعد تلقي لقاح JYNNEOS. لكن، نظرًا إلى تزايد احتمالية الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد تلقي نوع مختلف من اللقاح المعتمد للوقاية من الجدري، من المحتمل أن تزداد احتمالية الإصابة بهذا الالتهاب نتيجة تلقي لقاح JYNNEOS. يجب على الأشخاص الذين لديهم ثلاثة عوامل أو أكثر من العوامل الرئيسية لاحتمالية الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول والتدخين، أن يكونوا على دراية باحتمالية الإصابة.

هل يمكن أن تتلقى الحوامل أو المرضعات اللقاح؟

نعم، وهناك معلومات محدودة عن استخدام الحوامل أو المرضعات لقاح JYNNEOS. ولم تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أي دليل على الإضرار بنمو الجنين. ونظرًا إلى أن الفيروس الموجود في اللقاح لا يمكنه التكاثر في الخلايا البشرية، من المحتمل ألا يكون هناك خطر على الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية. يجب تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس Mpxv مؤخرًا، بغض النظر عما إذا كانوا حوامل أو مرضعات.

من الذين لا يمكنهم تلقي اللقاح؟

يجب على الأشخاص الذين لديهم رد فعل تحسسي شديد لجرعة سابقة من لقاح JYNNEOS عدم تلقي اللقاح. ويجب على الأشخاص الذين عانوا من رد فعل تحسسي شديد تجاه الجنتاميسين أو السيبروفلوكساسين، أو بروتين الدجاج أو البيض، ويتجنبون حاليًا تناول جميع منتجات الدجاج أو البيض، التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أو أي مقدم رعاية موجود في موقع اللقاح قبل تلقي اللقاح.

هل يجب تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس Mpxv؟

لا، يجب عدم تطعيم الأشخاص الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بفيروس Mpxv، في أثناء موجة التفشي التي بدأت في مايو 2022، حاليًا؛ لأنه من المرجح أن لديهم مناعة. معظم الأشخاص الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بفيروس Mpxv بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح لا يحتاجون إلى جرعة ثانية. يجب أن يتحدث الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة إلى مقدم الرعاية الذي يتعاملون معه عما إذا كانوا بحاجة إلى تلقي جرعة ثانية.

هل يجب تطعيم الأشخاص الذين سبق لهم تلقي لقاح الجدري؟

يجب على الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا ضد الجدري قبل هذا التفشي أن يتلقوا اللقاح، وذلك في حال تعرضوا لفيروس Mpxv، أو تحتل إصابتهم به؛ إذ قد تقلل مناعتهم من لقاح الجدري بمرور الوقت.

هل يمكنني تلقي اللقاح مع لقاحات أخرى في الوقت نفسه؟

يمكن إعطاء لقاح JYNNEOS قبل معظم اللقاحات أو بعدها أو معها في الوقت نفسه، ومنها لقاح الإنفلونزا ولقاح مرض (COVID-19). لكن، قد يوصى بانتظار الأشخاص الذين تزداد احتمالية إصابتهم بالتهاب عضلة القلب، وخاصة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و39 عامًا، لمدة أربعة أسابيع بين تلقي لقاح JYNNEOS ولقاح مرض (COVID-19)، مع العلم أن احتمالية الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد تلقي لقاح مرض (COVID-19) نادرة. إذا أصبت مؤخرًا بفيروس Mpxv، فيجب أن تتلقى لقاح JYNNEOS، حتى لو تلقيت لقاح مرض (COVID-19) مؤخرًا. تحدث إلى مقدم الرعاية الذي تتعامل معه إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بالوقت المناسب لتلقي اللقاح.

للمزيد من المعلومات عن أهلية تلقي اللقاح، يرجى زيارة [nyc.gov/mpox](https://www.nyc.gov/mpox). للعثور على موقع لتلقي اللقاح، تفضل بزيارة [nyc.gov/vaccinefinder](https://www.nyc.gov/vaccinefinder).