

تمباکو نوشی اور ویپنگ کے پالتو جانوروں کی صحت پر اثرات



پالتو جانوروں کو ویپ
کے کارٹریج میں موجود
مادہ نگلنے کے 15 سے 30
منٹ کے اندر نکوٹین سے
جان لیوا زہریلے اثرات کا
خطرہ ہو سکتا ہے۔



تمباکو نوشی کرنے والے
افراد کے ساتھ رہنے
والے پرندوں کو نمونیا،
پھیپھڑوں کا کینسر اور
آنکھوں، جلد، دل اور
زرخیزی کے مسائل کا
سامنا ہو سکتا ہے۔



تمباکو نوشی کرنے والے
افراد کے ساتھ رہنے والی
بلیوں کو لمفوما (لمفاوی
نظام کا کینسر) کا خطرہ
زیادہ ہوتا ہے۔



تمباکو نوشی کرنے والے
افراد کے ساتھ رہنے
والے کتوں کو ناک اور
پھیپھڑوں کے کینسر کا
خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔

اگر آپ تمباکو نوشی یا ویپنگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو ترک تمباکو نوشی کے ایک کوچ سے بات
کرنے کے لیے nysmokefree.com ملاحظہ کریں یا 866-697-8487 پر بات کریں۔

علاج کے دیگر وسائل، بشمول آپ کو تمباکو نوشی کم کرنے یا گھر پر تمباکو نوشی اور ویپنگ سے
گریز کرنے میں مدد دینے کے لیے اختیارات، کے لیے nyc.gov/nycquits ملاحظہ کریں۔