

# Cervicite

La cervicite est une inflammation (irritation) de la paroi du col de l'utérus. Le col de l'utérus est l'extrémité de l'utérus qui débouche sur le vagin.

La cervicite peut être le signe d'une infection. Les infections sexuellement transmissibles (IST), comme la chlamydia et la gonorrhée, peuvent causer une cervicite.

## Symptômes

La plupart des personnes atteintes de cervicite n'ont aucun symptôme. Si des symptômes apparaissent, ils peuvent inclure :

- un écoulement vaginal anormal ;
- des saignements entre les règles ou après un rapport sexuel vaginal ;
- des douleurs pendant ou après un rapport sexuel vaginal.



# Cervicite



## Prévention

- Les préservatifs peuvent empêcher la propagation des IST reconnues comme causes de la cervicite, comme la chlamydia et la gonorrhée.
- Le fait d'avoir plusieurs partenaires augmente votre risque d'être infectée par ces IST et de les propager.

## Dépistage

Si votre prestataire de soins de santé observe du sang ou du pus à l'extrémité du col de l'utérus à l'occasion d'un examen pelvien (interne), il utilisera un écouvillon pour prélever un échantillon de liquide sur le col de l'utérus pour l'analyser.

## Traitement

Votre prestataire de soins de santé peut vous donner des antibiotiques pour traiter les IST responsables de la cervicite.

## Pourquoi se faire traiter

Si elle n'est pas traitée, la cervicite causée par une IST peut :

- engendrer des douleurs sévères ou la stérilité (l'incapacité à avoir des enfants) ;
- augmenter le risque de grossesse extra-utérine (ectopique) ;
- augmenter le risque d'être infectée par le VIH ou de le transmettre.

## Partenaires sexuel(le)s

Si votre cervicite est causée par une IST, vos partenaires sexuel(le)s doivent être traité(e)s pour éviter de développer de graves problèmes de santé, de vous réinfecter ou de transmettre l'infection à d'autres personnes.

Si vous êtes testée positive à une IST, vous devez informer de votre infection tou(te)s les partenaires sexuel(le)s que vous avez eu(e)s au cours des deux derniers mois, afin qu'ils ou elles puissent être examiné(e)s et traité(e)s.

## Cervicite et grossesse

Toutes les femmes enceintes doivent se faire dépister pour les IST, dont le VIH, le plus tôt possible. Les IST pendant la grossesse peuvent causer des infections au niveau des yeux et des poumons d'un nouveau-né.

Les cliniques de santé sexuelle de la ville de New York proposent des services confidentiels, à bas prix ou gratuits, y compris des dépistages des IST et du VIH.

Pour trouver une clinique, consultez [nyc.gov/health/clinics](https://nyc.gov/health/clinics).