

# Cervicitis

La cervicitis es una inflamación (irritación) del cuello uterino. El cuello uterino es la parte inferior del útero que se extiende hacia dentro de la vagina.

La cervicitis puede ser un signo de una infección. Las infecciones de transmisión sexual (ITS), como la clamidia y la gonorrea, pueden ocasionar cervicitis.

## Síntomas

La mayoría de las personas con cervicitis no tienen síntomas. Cuando sí se presentan síntomas, estos incluyen:

- Flujo vaginal anormal
- Pérdidas (sangrado) entre los periodos o después del sexo vaginal
- Dolor durante o después del sexo vaginal



# Cervicitis



## Prevención

- Los preservativos pueden evitar el contagio de las ITS que causan cervicitis, como la clamidia y la gonorrea.
- Tener varias parejas sexuales aumenta el riesgo de contagiarse y transmitir estas ITS.

## Pruebas de detección

Si su proveedor de atención de salud observa sangre o pus en el extremo del cuello uterino durante un examen pélvico (interno), puede usar un hisopo para recolectar una muestra de fluido del cuello uterino y hacer una prueba de detección.

## Tratamiento

Su proveedor de atención de salud puede darle antibióticos para tratar cualquier ITS que cause cervicitis.

## Por qué recibir tratamiento

Si no se trata, la cervicitis causada por una ITS puede:

- Causar dolor intenso o infertilidad (incapacidad de tener hijos).
- Aumentar el riesgo de tener un embarazo tubárico (ectópico).
- Aumentar la probabilidad de contagiarse o transmitir VIH.

## Parejas sexuales

Si su cervicitis es causada por una ITS, sus parejas sexuales también deben tratarse para no desarrollar enfermedades graves, reinfectarlo a usted o transmitir la infección a otras personas.

Si usted da positivo en una ITS, debe informar a todas las parejas sexuales que haya tenido durante los dos meses anteriores al resultado que usted tiene una infección para que puedan someterse a una evaluación y tratamiento.

## Cervicitis y embarazo

Todas las embarazadas deben realizarse pruebas de detección de ITS, inclusive VIH, tan pronto como sea posible durante el embarazo. Las ITS en el embarazo pueden causar infecciones en los ojos y los pulmones de un bebé recién nacido.

Las Clínicas de Bienestar Sexual de la ciudad de Nueva York proporcionan servicios gratuitos o con un bajo costo y de manera confidencial, entre los que se incluyen pruebas de detección de ITS y VIH.

Para encontrar una clínica, visite [nyc.gov/health/clinics](https://nyc.gov/health/clinics).