

# 衣原體

衣原體是一種透過陰道性交、肛交和口交傳播的細菌性感染。它是紐約市內最常見的性傳播感染 (STI) 之一。

## 症狀

患有衣原體的大部分人群均無症狀。一旦呈現症狀，則可能包括：

- 陰道分泌物與往常不同
- 經期之間出血
- 陰莖排出分泌物
- 性交時或之後疼痛或出血
- 排尿時疼痛
- 便秘
- 直腸疼痛、排出分泌物或出血



# 衣原體



## 預防

避孕套或牙齒隔離障可預防衣原體的傳播。擁有多名伴侶將增加染上或傳播 STI 的風險，包括衣原體。

## 檢測

根據您所有過的性交類型，您的健康照護提供者可能會從尿液、宮頸、陰莖、直腸或喉嚨中取樣。請將您所採用的性交方式誠實地告知您的醫師。

## 治療

衣原體可使用抗生素治療。需要採取全面治療以清除感染，因此重要的是，即使在您感到好轉時，也要服用所有藥物。三至四個月後，您應當重複檢測，以確保您沒有再度遭到感染。

## 治療理由

若不治療，衣原體可導致嚴重疼痛、不孕不育（無法生育）和睪丸疼痛或腫脹。它可以增加發生輸卵管妊娠（宮外孕）的風險。  
患有衣原體還更易染上或傳播 HIV。

## 性伴侶

您的性伴侶也需要接受治療，以確保他們不會患上嚴重疾病，再次感染您或他人。請將您的感染情況告知您在過去兩個月間的所有性伴侶，使其能夠接受檢查和治療。您可以向健康照護提供者諮詢加速伴侶療法 (EPT)，讓您的提供者給您額外藥物或一份處方，用於您的性伴侶，使得他們能夠盡快接受衣原體治療。

## 衣原體和妊娠

所有妊娠人員應當在孕期盡早檢測是否患有衣原體或其他 STI，包括 HIV。衣原體可導致早產和新生兒體重過低。它還可能導致新生兒的眼睛和肺部遭到感染。

紐約市性健康診所提供機密且免費或廉價服務，包括 STI 和 HIV 檢測。

如需查找一家診所，請造訪：  
[nyc.gov/health/clinics](https://nyc.gov/health/clinics)。