

# Chlamydia

La chlamydia est une infection bactérienne qui se transmet par les relations sexuelles vaginales, anales ou orales. Il s'agit de l'une des infections sexuellement transmissibles (IST) les plus courantes dans la ville de New York.

## Symptômes

La plupart des personnes atteintes de chlamydia n'ont aucun symptôme. Si des symptômes apparaissent, ils peuvent inclure :

- un écoulement du vagin différent de l'écoulement habituel ;
- des saignements entre les règles ;
- un écoulement du pénis ;
- des douleurs ou des saignements pendant ou après les rapports sexuels ;
- des douleurs au moment d'uriner ;
- une constipation ;
- des douleurs, un écoulement ou des saignements au niveau du rectum.



# Chlamydia



## Prévention

Les préservatifs et les digues dentaires peuvent empêcher la propagation de la chlamydia. Le fait d'avoir plusieurs partenaires augmente votre risque d'être infecté(e) par des IST, dont la chlamydia.

## Dépistage

Selon les types de rapports sexuels que vous avez, votre prestataire de soins de santé peut analyser des échantillons provenant de votre urine, col de l'utérus, pénis, rectum ou gorge. Soyez honnête avec votre médecin concernant les types de rapports sexuels que vous avez.

## Traitement

La chlamydia se traite avec des antibiotiques. Le traitement complet est nécessaire pour éliminer l'infection. Il est donc important de prendre tous les médicaments, même si vous vous sentez mieux. Vous devez vous faire dépister à nouveau après trois à quatre mois pour vous assurer que vous n'avez pas été réinfecté(e).

## Pourquoi se faire traiter

Si elle n'est pas traitée, la chlamydia peut engendrer des douleurs sévères, la stérilité (incapacité à avoir des enfants) et des testicules douloureux ou gonflés. Elle peut augmenter le risque de grossesse extra-utérine (ectopique). La chlamydia augmente également le risque d'être infecté(e) par le VIH ou de le transmettre.

## Partenaires sexuel(le)s

Vos partenaires sexuel(le)s doivent être traité(e)s pour éviter de développer de graves problèmes de santé, de vous réinfecter ou de transmettre l'infection à d'autres personnes. Vous devez informer de votre infection tou(te)s les partenaires sexuel(le)s que vous avez eu(e)s au cours des deux derniers mois, afin qu'ils ou elles puissent être examiné(e)s et traité(e)s. Vous pouvez également demander à votre prestataire de soins de santé des informations sur le traitement accéléré des partenaires (TAP), qui autorise votre prestataire à vous donner des médicaments supplémentaires ou une ordonnance à remettre à votre ou vos partenaire(s) sexuel(le)s, afin

qu'il(s) ou elle(s) puisse(nt) être traité(e)s pour la chlamydia dès que possible.

## Chlamydia et grossesse

Toutes les femmes enceintes doivent se faire dépister pour la chlamydia et d'autres IST, dont le VIH, le plus tôt possible. La chlamydia peut causer un accouchement prématuré et un faible poids de naissance. Elle peut également engendrer des infections au niveau des yeux et des poumons d'un nouveau-né.

Les cliniques de santé sexuelle de la ville de New York proposent des services confidentiels, à bas prix ou gratuits, y compris des dépistages des IST et du VIH.

Pour trouver une clinique, consultez [nyc.gov/health/clinics](https://nyc.gov/health/clinics).