

衣原体

衣原体是一种通过阴道性交、肛交和口交传播的细菌性感染。它是纽约市内最常见的性传播感染 (STI) 之一。

症状

患有衣原体的大部分人群均无症状。一旦呈现症状, 则可能包括:

- 阴道分泌物与往常不同
- 经期之间出血
- 阴茎排出分泌物
- 性交时或之后疼痛或出血
- 排尿时疼痛
- 便秘
- 直肠疼痛、排出分泌物或出血



衣原体



预防

避孕套或牙齿隔离障可预防衣原体的传播。拥有多名伴侣将增加感染或传播 STI 的风险, 包括衣原体。

检测

根据您的所有过的性交类型, 您的医疗保健提供者可能会从尿液、宫颈、阴茎、直肠或喉咙中取样。请将您所采用的性交方式诚实地告知您的医生。

治疗

衣原体可使用抗生素治疗。需要采取全面治疗以清除感染, 因此重要的是, 即使在您感到好转时, 也要服用所有药物。三至四个月后, 您应当重复检测, 以确保您没有再度遭到感染。

治疗理由

若不治疗, 衣原体可导致严重疼痛、不孕不育(无法生育)和睾丸疼痛或肿胀。它可以增加发生输卵管妊娠(宫外孕)的风险。患有衣原体还更易染上或传播 HIV。

性伴侣

您的性伴侣也需要接受治疗, 以确保他们不会患上严重疾病, 再次感染您或他人。请将您的感染情况告知您在过去两个月间的所有性伴侣, 使其能够接受检查和治疗。您可以向医疗保健提供者咨询加速伴侣疗法 (EPT), 让您的提供者给您额外药物或一份处方, 用于您的性伴侣, 使得他们能够尽快接受衣原体治疗。

衣原体和妊娠

所有妊娠人员应当在孕期尽早检测是否患有衣原体或其他 STI, 包括 HIV。衣原体可导致早产和新生儿体重过低。它还可能导致新生儿的眼睛和肺部遭到感染。

纽约市性健康诊所提供机密且免费或廉价服务, 包括 STI 和 HIV 检测。

如需查找一家诊所, 请访问:
nyc.gov/health/clinics。