

Traitement rapide des partenaires (Expedited Partner Therapy, EPT) pour la gonorrhée :

Guide destiné aux partenaires qui ont reçu du céfixime



Pourquoi est-ce que je reçois cette prescription ou ce médicament ?

La gonorrhée, une infection qui se transmet pendant un rapport sexuel bucco-génital, anal ou vaginal, a été diagnostiquée à l'un(e) de vos partenaires sexuels. Un prestataire de soins de santé a donné à votre partenaire sexuel(le) une prescription ou un médicament à vous remettre afin que vous puissiez bénéficier du traitement pour la gonorrhée. Vous devez vous aussi suivre un traitement afin de ne pas développer des problèmes de santé graves, réinfecter votre ou vos partenaires sexuels ou transmettre l'infection.



Qu'est-ce que la gonorrhée ?

La gonorrhée est une infection sexuellement transmissible (IST) qui se transmet pendant un rapport sexuel bucco-génital, anal ou vaginal. En règle générale, les personnes atteintes de gonorrhée ne présentent aucun symptôme. En cas de symptômes, la personne affectée pourra ressentir une douleur ou une sensation de brûlure quand elle urine et présenter du pus ou des écoulements du pénis, du vagin ou de l'anus. Vous pouvez transmettre la gonorrhée même si vous ne présentez aucun symptôme. Si la gonorrhée n'est pas traitée, elle peut provoquer de graves problèmes de santé.



Qu'est-ce que ce médicament ?

Ce médicament est un antibiotique appelé céfixime. Il soigne l'infection à la gonorrhée mais pas les autres IST. Il est sans danger et efficace s'il est utilisé correctement.

Avant de prendre du céfixime, consultez un prestataire de soins de santé si vous avez des problèmes de

santé chroniques graves tels qu'une maladie rénale, cardiaque ou hépatique ou des maladies gastro-intestinales, notamment une colite (une maladie qui entraîne un gonflement de la paroi du côlon ou du gros intestin), si vous avez des troubles épileptiques ou si vous prenez des anticoagulants.

Vous **ne** devez **pas** prendre du céfixime si l'**une** des affirmations suivantes se vérifie :

- si vous êtes allergique ou si vous avez déjà eu une mauvaise réaction (par exemple, des difficultés respiratoires, une oppression thoracique, un resserrement de la gorge, le gonflement des lèvres ou de la langue, ou une éruption cutanée) ou vous avez déjà fait une réaction allergique à des antibiotiques, notamment à la ceftriaxone (Rocephin) et aux antibiotiques du groupe de la pénicilline (tels que l'ampicilline, l'amoxicilline, ou l'Augmentin, le Pen-VK ou le potassium de pénicilline V ou la benzathine pénicilline G [Bicillin L-A]) ;
- si vous présentez l'un de ces symptômes, consultez un prestataire de soins de santé le plus rapidement possible afin de vous faire prescrire un autre médicament qui soigne la gonorrhée.



Pourquoi dois-je prendre ce médicament ?

Si la gonorrhée n'est pas traitée, elle peut provoquer de graves problèmes de santé, tels que :

- infertilité, c'est-à-dire impossibilité d'avoir des enfants ;
- grossesse extra-utérine, c'est-à-dire une grossesse qui se développe en dehors de l'utérus et qui peut être mortelle ;
- infection des testicules, pouvant causer des douleurs et de la fièvre ;
- syndrome inflammatoire pelvien (SIP), une maladie douloureuse qui affecte l'utérus, les trompes et les ovaires.



Comment dois-je prendre ce médicament ?

- prenez le médicament par voie orale. Ne le partagez avec personne. Pour que le traitement soit efficace, vous devez le prendre en entier ;
- prenez les comprimés comme indiqué sur la prescription ou le flacon ;
- prenez le médicament pendant les repas pour éviter les maux d'estomac.



Que dois-je faire après avoir pris ce médicament ?

- vous et votre ou vos partenaires sexuels devez éviter les rapports bucco-génitaux, anaux et vaginaux pendant au moins sept jours après la fin de votre traitement et du traitement prescrit à votre ou vos partenaires sexuels. Ce médicament met sept jours à agir ;
- consultez un médecin et faites-vous dépister pour d'autres IST, y compris le VIH. Il est important de faire un dépistage pour d'autres IST car cette dose de médicament soigne uniquement la gonorrhée.



Que dois-je faire si je pense ne pas être atteint(e) de gonorrhée ?

Vous pouvez être atteint(e) de gonorrhée même si vous vous sentez en bonne santé et ne présentez aucun symptôme. Vous pouvez vous faire dépister pour en avoir la certitude. Toutefois, vous devez quand même prendre le médicament immédiatement.



Que dois-je faire si je suis enceinte ou si je pense l'être ?

Le céfixime est sans danger chez les femmes enceintes et il peut protéger le bébé de l'infection pendant la grossesse et l'accouchement. Il est également conseillé de consulter un prestataire de soins de santé dès que possible et lui expliquer qu'un traitement pour la gonorrhée vous a été prescrit parce que votre partenaire sexuel(le) était infecté(e). Il est

aussi recommandé de demander un dépistage pour les autres IST, car certaines d'entre elles peuvent être transmises à votre bébé.



Ce médicament a-t-il des effets secondaires ?

C'est possible. Il est possible que vous souffriez d'effets secondaires, tels que nausées, vomissements, diarrhée, flatulences, brûlures d'estomac et maux d'estomac. Ils sont courants et sans danger. Si vous vomissez dans l'heure qui suit la prise du céfixime, vous devrez prendre une autre dose, car il est possible que le médicament n'ait pas eu d'effet. Pour obtenir une dose supplémentaire, appelez le numéro de téléphone indiqué sur la prescription ou présentez-vous chez un prestataire de soins de santé ou dans une clinique.

Bien que cela soit rare, certaines personnes développent des réactions allergiques graves au céfixime. Ces réactions peuvent causer des difficultés respiratoires, une oppression thoracique, un resserrement de la gorge, le gonflement des lèvres ou de la langue, ou de l'urticaire (des boutons qui démangent). Si vous souffrez de l'une de ces réactions après avoir pris ce médicament, appelez immédiatement le **911** ou présentez-vous aux urgences les plus proches.



Que se passe-t-il si je n'ai pas les moyens de payer ce médicament ?

Présentez-vous dans une clinique de santé sexuelle de la ville de New York et expliquez que votre ou vos partenaires sexuels sont atteints de gonorrhée. Pour trouver une clinique, appelez le **311** ou consultez le site nyc.gov/health/clinics.



Comment puis-je prévenir les IST ?

La meilleure façon de prévenir les IST est d'utiliser des préservatifs correctement et systématiquement lorsque vous avez des relations sexuelles.