

# Tratamiento acelerado de la gonorrea para la pareja (EPT, por sus siglas en inglés):

## Una guía para parejas que recibieron cefixima



### ¿Por qué me dieron esta receta o este medicamento?

Una de sus parejas sexuales recibió el diagnóstico de gonorrea, una infección que se contagia durante las relaciones sexuales orales, anales o vaginales. Un proveedor de atención médica le dio a su pareja una receta o un medicamento para usted, así puede recibir el tratamiento necesario para la gonorrea. Usted también necesita tratamiento para no tener problemas de salud graves, no volver a infectar a sus parejas sexuales o no transmitir la infección a otras personas.



### ¿Qué es la gonorrea?

La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) que se transmite a través de las relaciones sexuales orales, anales o vaginales. Las personas que tienen gonorrea podrían no tener síntomas. Si las personas tienen síntomas, estos pueden incluir dolor o ardor al orinar y pus o secreción en el pene, la vagina o el ano. Puede transmitir la gonorrea a otras personas, incluso si no tiene síntomas. Si no se trata, la gonorrea puede causar problemas de salud graves.



### ¿Qué es este medicamento?

El medicamento es un antibiótico llamado cefixima. Sirve para curar la infección por gonorrea, pero no para tratar otras ITS. Cuando se lo toma de manera correcta, es seguro y eficaz.

Antes de tomar la cefixima, hable con un proveedor de atención médica si tiene problemas de salud graves crónicos, como enfermedades en los riñones, en el corazón o en el hígado o enfermedades gastrointestinales, sobre todo colitis (una condición que causa inflamación en el revestimiento del colon o intestino grueso); tiene convulsiones; o está tomando anticoagulantes.

**No** tome la cefixima si **cualquiera** de las siguientes opciones es cierta:

- Es alérgico o alguna vez tuvo una reacción grave (como dificultad para respirar, opresión en el pecho, cierre de la garganta, hinchazón de los labios o la lengua, o sarpullido) o alergia a cualquier antibiótico, incluyendo los antibióticos ceftriaxona (Rocephin) y penicilina (como ampicilina, amoxicilina o Augmentin, Pen-VK o penicilina V potasio, o penicilina G benzatina [Bicillin L-A]).
- Si tiene alguna de estas condiciones, consulte a un proveedor de atención médica lo antes posible para que le den un medicamento diferente que cure la gonorrea.



### ¿Por qué debería tomar el medicamento?

Si no se trata, la gonorrea puede provocar problemas de salud graves como:

- Infertilidad— imposibilidad de tener hijos.
- Embarazo ectópico— un embarazo fuera del útero, que puede ser mortal.
- Infección en los testículos, que causa dolor y fiebre.
- Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP): una enfermedad dolorosa que afecta al útero, a las trompas de Falopio y a los ovarios.



## ¿Cómo debería tomar el medicamento?

- Tome el medicamento por vía oral. No lo comparta con otros. Debe completar el tratamiento para que sea eficaz.
- Tome las pastillas como se indica en la receta o en el frasco.
- Tome el medicamento con comidas para evitar el dolor de estómago.



## ¿Qué debería hacer después de tomar el medicamento?

- No tenga relaciones sexuales orales, anales ni vaginales por al menos siete días después de que usted y sus parejas sexuales hayan terminado el tratamiento. El medicamento demora siete días en hacer efecto.
- Consulte con un médico y hágase las pruebas de detección de otras ITS, incluyendo el VIH. Es importante que se haga las pruebas de detección de otras ITS porque esta dosis del medicamento solo curará la gonorrea.



## ¿Qué ocurre si creo que no tengo gonorrea?

Puede tener gonorrea incluso si se siente bien y no tiene síntomas. Puede hacerse una prueba de detección para saber si tiene gonorrea. Sin embargo, aún así debería tomar el medicamento ahora.



## ¿Qué sucede si estoy embarazada o creo que podría estarlo?

La cefixima es segura para embarazadas y puede evitar que el bebé se infecte durante el embarazo y el parto. También debería consultar a un proveedor de atención médica lo antes

posible y decirle que recibió tratamiento para la gonorrea porque su pareja sexual tenía la enfermedad. Además, debería pedir que le hagan pruebas de detección de otras ITS, ya que algunas pueden transmitirse al bebé.



## ¿Tiene el medicamento efectos secundarios?

Puede tenerlos. Si usted tiene efectos secundarios, estos podrían incluir náuseas, vómitos, diarrea, gases, acidez estomacal y dolor de estómago. Son frecuentes y no son peligrosos. Si vomita a menos de una hora después de haber tomado la cefixima, deberá tomar otra dosis porque es posible que no haya hecho efecto. Para obtener más medicamentos, llame al número de teléfono que figura en la receta o consulte a un proveedor de atención médica o vaya a una clínica.

Aunque es poco frecuente, algunas personas tienen reacciones alérgicas graves a la cefixima. Estas reacciones pueden causar problemas para respirar, opresión en el pecho, cierre de la garganta, hinchazón de los labios o la lengua y urticaria (protuberancias con picazón). Si tiene alguna de estas reacciones después de tomar este medicamento, llame al **911** de inmediato o vaya a la sala de emergencias más cercana.



## ¿Qué sucede si no puedo pagar el medicamento?

Visite una clínica de bienestar sexual de la ciudad de Nueva York y dígales que sus parejas sexuales tienen gonorrea. Para encontrar una clínica, llame al **311** o visite [nyc.gov/health/clinics](http://nyc.gov/health/clinics).



## ¿Cómo puedo prevenir las ITS?

El uso correcto y constante de condones durante las relaciones sexuales es la mejor manera de prevenir las ITS.