

# 生殖器疣和肛門疣

生殖器疣和肛門疣可由人乳頭瘤病毒 (HPV) 導致。HPV 是美國境內最常見的性傳播感染 (STI)

。HPV 感染可引發生殖器疣，並最終可導致癌症。

## 症狀

大部分患有 HPV 的人群沒有長疣或其他症狀。若已經發現了生殖器疣和肛門疣，則它們看起來像肉疙瘩。疣還可能隱蔽生長在宮頸、陰道或肛門內。一旦長疣，則可能導致瘙癢。



紐約市性健康診所提供機密且免費或廉價服務，包括 STI 和 HIV 檢測。

如需查找一家診所，請造訪：  
**[nyc.gov/health/clinics](https://nyc.gov/health/clinics)**。

# 生殖器疣和肛門疣



## 預防

避免生長生殖器疣和肛門疣的最佳方式是接種 HPV 疫苗。

HPV 疫苗建議提供給：

- 年齡在 9-12 周歲的兒童
- 在小時候沒有完整接種 HPV 疫苗組的青年和少年
- 此前並未接種疫苗的，年齡在 26 周歲以下的人員
- 年齡在 27-45 周歲，此前並未接種疫苗的某些成人

青少年若在不到 15 周歲時開始接種疫苗組，則在接受兩次疫苗期間至少要間隔六個月。青少年若在 15 周歲及以上時開始接種疫苗組，則需要在六個月間接受三次疫苗。

避孕套和牙齒隔離障能夠降低傳播 HPV 的幾率，但 HPV 仍舊可能會感染沒有被避孕套和牙齒隔離障遮蓋的區域。

## 檢測

您的健康照護提供者可透過查看您是否有生殖器疣或肛門疣，告知您結果。沒有臨床驗血可以檢測您是否接觸了 HPV。

## 治療

治療取決於疣的大小、數量和位置。疣可以使用藥膏或藥液去除，採用液氮凍結，或採用手術或激光治療去除。

## 治療理由

若不治療，生殖器疣可能會長大、出血，導致疼痛或瘙癢。有時，生殖器疣和肛門疣可無需治療自行治愈。

## 性伴侶

如果您被診斷患有生殖器疣或肛門疣，請告知您的當前性伴侶，使其能夠針對疣或其他 STI 接受評估和適當治療。目前尚無廣泛可用的檢測告知某人在沒有可見疣或其他症狀時，是否患有 HPV。鼓勵您的性伴侶在符合資格的情況下，接種 HPV 疫苗。

## 生殖器疣和肛門疣和妊娠

妊娠期間，生殖器疣和肛門疣可能發展更加迅速。這對寶寶產生的風險較小，但您在治療生殖器疣或肛門疣時，應當告知您的健康照護提供者您已懷孕。