

# Verrues génitales et anales

Les verrues génitales et anales sont causées par le papillomavirus humain (HPV). Le HPV est l'infection sexuellement transmissible (IST) la plus courante aux États-Unis. L'infection à HPV peut engendrer des verrues génitales et éventuellement conduire au cancer.

## Symptômes

La plupart des personnes atteintes du HPV ne présentent ni verrues ni autres symptômes. Si des verrues sont présentes sur les régions génitales ou anales, elles ressemblent à des boules de chair. Les verrues peuvent être dissimulées sur le col de l'utérus, dans le vagin ou dans l'anus. Lorsqu'elles existent, les verrues génitales et anales peuvent entraîner des démangeaisons.



Les cliniques de santé sexuelle de la ville de New York proposent des services confidentiels, à bas prix ou gratuits, y compris des dépistages des IST et du VIH.

Pour trouver une clinique, consultez [nyc.gov/health/clinics](https://nyc.gov/health/clinics).

# Verrues génitales et anales



## Prévention

La meilleure façon de prévenir les verrues génitales et anales est la vaccination contre le HPV.

Le vaccin contre le HPV est recommandé pour :

- les enfants âgés de 9 à 12 ans ;
- les adolescent(e)s et jeunes adultes qui n'ont pas terminé leur série de vaccination contre le HPV lorsqu'ils ou elles étaient plus jeunes ;
- les personnes âgées de moins de 27 ans qui n'ont pas été vaccinées auparavant ;
- certains adultes âgés de 27 à 45 ans qui n'ont pas été vaccinés auparavant.

Les adolescent(e)s qui commencent la série avant l'âge de 15 ans doivent recevoir deux injections à au moins six mois d'intervalle. Toute personne qui commence la série à l'âge de 15 ans ou plus devra recevoir trois injections sur une période de six mois.

Les préservatifs et les digues dentaires peuvent réduire le risque de propagation du HPV, mais le HPV peut tout de même infecter les zones non recouvertes par le préservatif ou la digue dentaire.

## Dépistage

Votre prestataire de soins de santé peut voir si vous avez des verrues génitales ou anales en vous examinant. Il n'existe pas de test sanguin clinique pour savoir si vous avez été exposé(e) au HPV.

## Traitement

Le traitement dépend de la taille, du nombre et de la localisation des verrues. Les verrues peuvent être éliminées à l'aide de crèmes et liquides médicamenteux, en les brûlant avec de l'azote liquide, par intervention chirurgicale ou traitement au laser.

## Pourquoi se faire traiter

Si elles ne sont pas traitées, les verrues génitales peuvent grossir, saigner et causer des douleurs et des démangeaisons. Il arrive que les verrues génitales et anales disparaissent toutes seules sans traitement.

## Partenaires sexuel(le)s

Si on vous diagnostique des verrues génitales ou anales, informez-en votre ou vos partenaire(s) sexuel(le)s actuel(le)s afin qu'il(s) ou elle(s) puisse(nt) se faire examiner pour détecter des verrues et d'autres IST et être traité(e)s de manière appropriée. Il n'existe actuellement aucun test largement disponible permettant de savoir si une personne sans verrues visibles ni autres symptômes est atteinte du HPV. Encouragez votre ou vos partenaire(e) sexuel(le)s à se faire vacciner contre le HPV s'il(s) ou elle(s) est/sont éligibles.

## Verrues génitales et anales et grossesse

Pendant la grossesse, il se peut que les verrues génitales et anales grossissent plus rapidement. Le risque pour le bébé est réduit, mais vous devriez informer votre prestataire de soins de santé de votre grossesse lors de la consultation pour traiter les verrues génitales et anales.