

生殖器疣和肛门疣

生殖器疣和肛门疣可由人乳头瘤病毒 (HPV) 导致。HPV 是美国境内最常见的性传播感染 (STI)。HPV 感染可引发生殖器疣,并最终可导致癌症。

症状

大部分患有 HPV 的人群没有长疣或其他症状。若已经发现了生殖器疣和肛门疣,则它们看起来像肉疙瘩。疣还可能隐蔽生长在宫颈、阴道或肛门内。一旦长疣,则可能导致瘙痒。



纽约市性健康诊所提供机密且免费或廉价服务,包括 STI 和 HIV 检测。

如需查找一家诊所,请访问:
nyc.gov/health/clinics。

生殖器疣和肛门疣



预防

避免生长生殖器疣和肛门疣的最佳方式是接种 HPV 疫苗。

HPV 疫苗建议提供给：

- 年龄在 9-12 周岁的儿童
- 在小时候没有完整接种 HPV 疫苗组的青年和少年
- 此前并未接种疫苗的，年龄在 26 周岁以下的人员
- 年龄在 27-45 周岁，此前并未接种疫苗的某些成人

青少年若在不到 15 周岁时开始接种疫苗组，则在接受两次疫苗期间至少要间隔六个月。青少年若在 15 周岁及以上时开始接种疫苗组，则需要在六个月间接受三次疫苗。

避孕套和牙齿隔离障能够降低传播 HPV 的几率，但 HPV 仍旧可能会感染没有被避孕套和牙齿隔离障遮盖的区域。

检测

您的医疗保健提供者可通过查看您是否有生殖器疣或肛门疣，告知您结果。没有临床验血可以检测您是否接触了 HPV。

治疗

治疗取决于疣的大小、数量和位置。疣可以使用药膏或药液去除，采用液氮冻结，或采用手术或激光治疗去除。

治疗理由

若不治疗，生殖器疣可能会长大、出血，导致疼痛或瘙痒。有时，生殖器疣和肛门疣可无需治疗自行治愈。

性伴侣

如果您被诊断患有生殖器疣或肛门疣，请告知您的当前性伴侣，使其能够针对疣或其他 STI 接受评估和适当治疗。目前尚无广泛可用的检测告知某人在没有可见疣或其他症状时，是否患有 HPV。鼓励您的性伴侣在符合资格的情况下，接种 HPV 疫苗。

生殖器疣和肛门疣和妊娠

妊娠期间，生殖器疣和肛门疣可能发展更加迅速。这对宝宝产生的风险较小，但您在治疗生殖器疣或肛门疣时，应当告知您的医疗保健提供者您已怀孕。