

淋病

淋病是一種透過陰道性交、肛交和口交傳播的細菌性感染。

症狀

患有淋病的大部分人群均無症狀。一旦呈現症狀，則可能包括：

- 陰道分泌物與往常不同
- 經期之間出血
- 陰莖排出黃色或綠色分泌物（滴狀）
- 性交時或之後疼痛或出血
- 排尿時疼痛便秘
- 直腸疼痛、出血或排出分泌物



淋病



預防

避孕套或牙齒隔離障可預防淋病的傳播。擁有多名伴侶會增加您感染或傳播性傳播感染 (STI) 的風險，包括淋病。

檢測

根據您所有過的性交類型，您的健康照護提供者可能會從尿液、宮頸、陰莖、直腸或喉嚨中取樣。請將您所採用的性交方式誠實地告知您的醫師。

治療

淋病可使用抗生素治療。需要採取全面治療以清除感染，因此重要的是，即使在您感到好轉時，也要服用所有藥物。

三至四個月後，您應當重複檢測，以確保您沒有再度遭到感染，但您的提供者可能會建議在三個月內就進行重複檢測。

治療理由

若不治療，淋病可導致嚴重疼痛、不孕不育（無法生育）和睪丸疼痛或腫脹。增加發生輸卵管妊娠（宮外孕）的風險。患有淋病還更易染上或傳播 HIV。

性伴侶

您的性伴侶也需要接受治療，以確保他們不會患上嚴重疾病，再次感染您或他人。請將您的感染情況告知您在過去兩個月間的所有性伴侶，使其能夠接受檢查和治療。

淋病 和 妊娠

所有妊娠人員應當在孕期盡早檢測是否患有淋病和其他 STI，包括 HIV。淋病可導致流產和早產。它還可能導致新生兒的眼睛遭到感染。

紐約市性健康診所提供機密且免費或廉價服務，包括 STI 和 HIV 檢測。

如需查找一家診所，請造訪：
nyc.gov/health/clinics。