

Gonorrhée

La gonorrhée est une infection bactérienne qui se transmet par les relations sexuelles vaginales, anales ou orales.

Symptômes

La plupart des personnes atteintes de gonorrhée n'ont aucun symptôme. Si des symptômes apparaissent, ils peuvent inclure :

- un écoulement du vagin différent de l'écoulement habituel ;
- des saignements entre les règles ;
- un écoulement jaunâtre ou verdâtre (gouttes) du pénis ;
- des douleurs ou des saignements pendant ou après les rapports sexuels ;
- des douleurs au moment d'uriner ;
- une constipation ;
- des douleurs, saignements ou écoulements au niveau du rectum.



Gonorrhée



Prévention

Les préservatifs et les digues dentaires peuvent empêcher la propagation de la gonorrhée. Le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuel(le)s augmente votre risque de contracter ou de propager des infections sexuellement transmissibles (IST) comme la gonorrhée.

Dépistage

Selon les types de rapports sexuels que vous avez, votre prestataire de soins de santé peut analyser des échantillons provenant de votre urine, col de l'utérus, pénis, rectum ou gorge. Soyez honnête avec votre prestataire de soins de santé concernant les types de rapports sexuels que vous avez.

Traitement

La gonorrhée se traite avec des antibiotiques. Le traitement complet est nécessaire pour éliminer l'infection. Il est donc important de prendre tous les médicaments, même si vous vous sentez mieux.

Vous devez vous faire dépister à nouveau après trois à quatre mois pour vous assurer que vous n'avez pas été réinfecté(e). Cependant, votre prestataire peut recommander de vous faire dépister à nouveau avant trois mois.

Pourquoi se faire traiter

Si elle n'est pas traitée, la gonorrhée peut engendrer des douleurs sévères, la stérilité (incapacité à avoir des enfants) et des testicules douloureux ou gonflés. Elle peut augmenter le risque de grossesse extra-utérine (ectopique). La gonorrhée accroît également le risque d'être infecté(e) par le VIH ou de le transmettre.

Partenaires sexuel(le)s

Votre ou vos partenaires sexuel(le)s doivent également être traité(e)s pour éviter de développer de graves problèmes de santé, de vous réinfecter ou de transmettre l'infection à d'autres personnes. Vous devez informer de votre infection tou(te)s les partenaires sexuel(le)s que vous avez eu(e)s au cours des deux derniers mois, afin qu'il(s) ou elle(s) puisse(nt) être examiné(e)s et traité(e)s.

Gonorrhée et grossesse

Toutes les femmes enceintes doivent se faire dépister pour la gonorrhée et d'autres IST, dont le VIH, le plus tôt possible. La gonorrhée peut entraîner des fausses couches et des accouchements prématurés. Elle peut également engendrer des infections au niveau des yeux d'un nouveau-né.

Les cliniques de santé sexuelle de la ville de New York proposent des services confidentiels, à bas prix ou gratuits, y compris des dépistages des IST et du VIH.

Pour trouver une clinique, consultez [nyc.gov/health/clinics](https://www.nyc.gov/health/clinics).