

# 淋病

淋病是一种通过阴道性交、肛交和口交传播的细菌性感染。

## 症状

患有淋病的大部分人群均无症状。一旦呈现症状,则可能包括:

- 阴道分泌物与往常不同
- 经期之间出血
- 阴茎排出黄色或绿色分泌物(滴状)
- 性交时或之后疼痛或出血
- 排尿时疼痛
- 便秘
- 直肠疼痛、出血或排出分泌物



# 淋病



## 预防

避孕套或牙齿隔离障可预防淋病的传播。拥有多名伴侣会增加您感染或传播性传播感染 (STI) 的风险, 包括淋病。

## 检测

根据您的所有过的性交类型, 您的医疗保健提供者可能会从尿液、宫颈、阴茎、直肠或喉咙中取样。请将您所采用的性交方式诚实地告知您的医生。

## 治疗

淋病可使用抗生素治疗。需要采取全面治疗以清除感染, 因此重要的是, 即使在您感到好转时, 也要服用所有药物。

三至四个月后, 您应当重复检测, 以确保您没有再度遭到感染, 但您的提供者可能会建议在三个月内就进行重复检测。

## 治疗理由

若不治疗, 淋病可导致严重疼痛、不孕不育 (无法生育) 和睪丸疼痛或肿胀。增加发生输卵管妊娠 (宫外孕) 的风险。患有淋病还更易染上或传播 HIV。

## 性伴侣

您的性伴侣也需要接受治疗, 以确保他们不会患上严重疾病, 再次感染您或他人。请将您的感染情况告知您在过去两个月间的所有性伴侣, 使其能够接受检查和治疗。

## 淋病和妊娠

所有妊娠人员应当在孕期尽早检测是否患有淋病和其他 STI, 包括 HIV。淋病可导致流产和早产。它还可能导致新生儿的眼睛遭到感染。

纽约市性健康诊所提供机密且免费或廉价服务, 包括 STI 和 HIV 检测。

如需查找一家诊所, 请访问:  
[nyc.gov/health/clinics](http://nyc.gov/health/clinics)。