

# Gonorrea

La gonorrea es una infección bacteriana que se contagia a través del sexo vaginal, anal y oral.

## Síntomas

La mayoría de las personas con gonorrea no tienen síntomas. Cuando sí se presentan síntomas, estos incluyen:

- Flujo vaginal que es diferente al habitual
- Sangrado entre los periodos
- Secreción (goteo) amarilla o verde por el pene
- Dolor o sangrado durante o después del sexo
- Dolor al orinar
- Constipación
- Dolor, sangrado o secreción en el recto



# Gonorrea



## Prevención

Los preservativos y las barreras bucales pueden evitar el contagio de la gonorrea. Tener varias parejas sexuales aumenta el riesgo de contagiarse o transmitir infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la gonorrea.

## Pruebas de detección

Según el tipo de sexo que usted tenga, su proveedor de atención de salud puede obtener muestras de su orina, cuello uterino, pene, recto o garganta. Sea honesto con su proveedor de atención de salud sobre los tipos de sexo que suele tener.

## Tratamiento

La gonorrea se trata con antibióticos. Se necesita realizar el tratamiento completo para eliminar la infección, por lo que es importante tomar todos los medicamentos, incluso si se siente mejor.

Debe volver a realizarse una prueba de detección de tres a cuatro meses después para asegurarse de que no se infectó nuevamente, pero su proveedor puede recomendarle que se realice la prueba de detección antes de los tres meses.

## Por qué recibir tratamiento

Si no se trata, la gonorrea puede causar dolor intenso, infertilidad (incapacidad de tener hijos) y dolor o inflamación en los testículos. Puede aumentar el riesgo de tener un embarazo tubárico (ectópico). Tener gonorrea también aumenta la probabilidad de contagiarse o transmitir VIH.

## Parejas sexuales

Su(s) pareja(s) sexual(es) también debe(n) tratarse para no desarrollar enfermedades graves, reinfectarlo a usted o transmitir la infección a otras personas. Debe informar a todas las parejas sexuales que haya tenido durante los dos meses anteriores al resultado que usted tiene una infección para que puedan someterse a una evaluación y tratamiento.

## Gonorrea y embarazo

Todas las embarazadas deben realizarse pruebas de detección de gonorrea y otras ITS, inclusive VIH, tan pronto como sea posible durante el embarazo. La gonorrea puede ocasionar un aborto espontáneo y un parto prematuro. También puede causar infecciones en los ojos de un bebé recién nacido.

Las Clínicas de Bienestar Sexual de la ciudad de Nueva York proporcionan servicios gratuitos o con un bajo costo y de manera confidencial, entre los que se incluyen pruebas de detección de ITS y VIH.

Para encontrar una clínica, visite [nyc.gov/health/clinics](https://nyc.gov/health/clinics).