

盆腔炎

盆腔炎 (PID) 是對某些生殖器官的感染，包括輸卵管、卵巢和子宮。PID 並非是性傳播感染 (STI)，但可能屬於未經治療的 STI（例如：衣原體或淋病）所引發的一種併發症。



紐約市性健康診所提供機密且免費或廉價服務，包括 STI 和 HIV 檢測。

如需查找一家診所，請造訪：
nyc.gov/health/clinics。

盆腔炎 (PID)



症狀

患有 PID 的某些人群沒有症狀。一旦呈現症狀，則可能包括：

- 腹痛
- 陰道分泌物與往常不同
- 性交時或之後疼痛或出血
- 發燒

預防

避孕套或牙齒隔離障可預防如衣原體和淋病這樣的 STI 的傳播。定期對 STI 進行檢測。及時治療衣原體和淋病可預防 PID。擁有多名伴侶將增加感染 STI 的風險。

檢測

沒有針對 PID 的檢測。健康照護提供者將進行盆腔檢查以診斷 PID。

治療

- PID 可以使用抗生素進行治療。
- 請盡早治療。此舉可以阻止該疾病損傷生殖器官，但無法修復任何已經造成的損傷。
- 需要進行全面治療以清除感染。即使您感覺有所好轉，也請服用所有藥物。
- 完成治療後，請在兩至三日後進行複查。PID 若未經妥善治療，則可引發嚴重感染並需要住院治療。

治療理由

若不治療，PID 可導致嚴重疼痛和不孕不育（無法生育）。它還可以增加發生輸卵管妊娠（宮外孕）的風險。

性伴侶

PID 可因如衣原體和淋病這樣的 STI 所引發。如果您被診斷患有 STI，則您的性伴侶也需要接受治療，以確保他們不會患上嚴重疾病，再次感染您或他人。請將您的感染情況告知您在過去兩個月間的所有性伴侶，使其能夠接受檢查和治療。