

Maladie inflammatoire pelvienne

La maladie inflammatoire pelvienne (MIP) est une infection touchant certains organes reproducteurs, notamment les trompes de Fallope, les ovaires et l'utérus. La MIP n'est pas une infection sexuellement transmissible (IST), mais il peut s'agir d'une complication d'IST non traitées comme la chlamydia ou la gonorrhée.



Les cliniques de santé sexuelle de la ville de New York proposent des services confidentiels, à bas prix ou gratuits, y compris des dépistages des IST et du VIH.

Pour trouver une clinique, consultez nyc.gov/health/clinics.

Maladie inflammatoire pelvienne (MIP)



Symptômes

Certaines personnes atteintes de MIP n'ont aucun symptôme. Si des symptômes apparaissent, ils peuvent inclure :

- des douleurs abdominales ;
- un écoulement du vagin différent de l'écoulement habituel ;
- des douleurs ou des saignements pendant ou après les rapports sexuels ;
- de la fièvre.

Prévention

Les préservatifs et les digues dentaires peuvent empêcher la propagation des IST comme la chlamydia et la gonorrhée. Faites-vous dépister régulièrement pour les IST. Un traitement contre la chlamydia et la gonorrhée pris rapidement peut prévenir la MIP. Le fait d'avoir plusieurs partenaires augmente votre risque d'être infectée par des IST.

Dépistage

Il n'existe aucun test de dépistage pour la MIP. Un prestataire de soins de santé effectuera un examen pelvien pour diagnostiquer la MIP.

Traitement

- La MIP peut être traitée avec des antibiotiques.
- Commencez le traitement aussi tôt que possible. Cela peut empêcher de nouvelles lésions des organes reproducteurs, mais cela ne peut pas réparer les lésions existantes.
- Le traitement complet est nécessaire pour éliminer l'infection. Prenez tous les médicaments, même si vous vous sentez mieux.
- Faites-vous dépister deux à trois jours après la fin du traitement. Si elle n'est pas traitée correctement, la MIP peut devenir une infection grave nécessitant une hospitalisation.

Pourquoi se faire traiter

Si elle n'est pas traitée, la MIP peut engendrer des douleurs sévères et la stérilité (incapacité à avoir des enfants). Elle peut augmenter le risque de grossesse extra-utérine (ectopique).

Partenaires sexuel(le)s

La MIP peut être causée par des IST comme la chlamydia et la gonorrhée. Si on vous diagnostique une IST, vos partenaires sexuel(le)s doivent être traité(e)s pour éviter de développer de graves problèmes de santé, de vous réinfecter ou de transmettre l'infection à d'autres personnes. Vous devez informer de votre infection tou(te)s les partenaires sexuel(le)s que vous avez eu(e)s au cours des deux derniers mois, afin qu'ils ou elles puissent être examiné(e)s et traité(e)s.