

Воспалительное заболевание органов малого таза

Воспалительное заболевание органов малого таза (ВЗОМТ) — это инфекционное заболевание таких репродуктивных органов, как фаллопиевы трубы, яичники и матка. ВЗОМТ не является инфекцией, передающейся половым путем (ИППП), но может стать осложнением таких невылеченных ИППП, как хламидиоз и гонорея.



Клиники сексуального здоровья г. Нью-Йорк предоставляют конфиденциальные недорогие или бесплатные услуги, включая тестирование на ИППП и ВИЧ.

Чтобы найти клинику, посетите nyc.gov/health/clinics.

Воспалительное заболевание органов малого таза (ВЗОМТ)



Симптомы

У некоторых людей с ВЗОМТ он протекает бессимптомно. Если симптомы возникают, в их число могут входить:

- боли в области живота;
- необычные влагалищные выделения;
- боль или кровотечение во время или после секса;
- жар.

Профилактика

Использование презервативов и защитных ротовых прокладок может предотвратить распространение таких ИППП, как хламидиоз и гонорея. Регулярно проходите тестирование на ИППП. Своевременное лечение хламидиоза и гонореи может предотвратить ВЗОМТ. Наличие многочисленных половых партнеров повышает риск заражения ИППП.

Тестирование

Анализа на ВЗОМТ не существует. Диагноз ВЗОМТ ставится в ходе гинекологического осмотра.

Лечение

- ВЗОМТ может быть вылечено антибиотиками.
- Начинайте лечение при первой же возможности. Лечение может остановить поражение репродуктивных органов, но не сможет восстановить уже имеющиеся повреждения.
- Для избавления от инфекции надо пройти полный курс лечения. Доведите курс приема медикаментов до конца, даже если вы чувствуете себя лучше.
- Через два–три дня после завершения курса лечения необходимо пройти повторное тестирование. Невылеченное ВЗОМТ может привести к серьезной инфекции, требующей госпитализации.

Зачем необходимо лечение

При отсутствии лечения ВЗОМТ может вызвать сильные боли и бесплодие (неспособность иметь детей). Также оно может увеличить риск внематочной (трубной) беременности.

Половые партнеры

ВЗОМТ может быть вызвано такими ИППП, как хламидиоз и гонорея. Если у вас обнаружили ИППП, вашим половым партнерам также нужно пройти лечение, чтобы избежать возникновения серьезных проблем со здоровьем, вашего повторного заражения или распространения инфекции. Вы должны сообщить о наличии инфекции всем своим половым партнерам за последние два месяца, чтобы они тоже получили возможность осмотра и лечения.