

盆腔炎

盆腔炎 (PID) 是对某些生殖器官的感染, 包括输卵管、卵巢和子宫。PID 并非性传播感染 (STI), 但可能属于未经治疗的 STI (例如: 衣原体或淋病) 所引发的一种并发症。



纽约市性健康诊所提供机密且免费或廉价服务, 包括 STI 和 HIV 检测。

如需查找一家诊所, 请访问:
nyc.gov/health/clinics。

盆腔炎 (PID)



症状

患有 PID 的某些人群没有症状。一旦呈现症状,则可能包括:

- 腹痛
- 阴道分泌物与往常不同
- 性交时或之后疼痛或出血
- 发烧

预防

避孕套或牙齿隔离障可预防如衣原体和淋病这样的 STI 的传播。定期对 STI 进行检测。及时治疗衣原体和淋病可预防 PID。拥有多名伴侣将增加感染 STI 的风险。

检测

没有针对 PID 的检测。医疗保健提供者将进行盆腔检查以诊断 PID。

治疗

- PID 可以使用抗生素进行治疗。
- 请尽早治疗。此举可以阻止该疾病损伤生殖器官,但无法修复任何已经造成的损伤。
- 需要进行全面治疗以清除感染。即使您感觉有所好转,也请服用所有药物。
- 完成治疗后,请在两至三日后进行复查。PID 若未经妥善治疗,则可引发严重感染并需要住院治疗。

治疗理由

若不治疗, PID 可导致严重疼痛和不孕不育(无法生育)。它还可以增加发生输卵管妊娠(宫外孕)的风险。

性伴侣

PID 可因如衣原体和淋病这样的 STI 所引发。如果您被诊断患有 STI,则您的性伴侣也需要接受治疗,以确保他们不会患上严重疾病,再次感染您或他人。请将您的感染情况告知您在过去两个月间的所有性伴侣,使其能够接受检查和治疗。