

疥瘡

疥瘡是指疥蟲在皮下寄生的疾病。疥瘡可以透過性交和皮膚接觸進行傳播。它還可透過某人接觸患有疥瘡人員的衣物、毛巾和床上用品時進行傳播。人和動物之間不會相互傳播疥蟲。

症狀

- 極度瘙癢，特別是在皮膚褶皺區域（例如：手腕、手臂、手肘、膝蓋、生殖器、指間、腰部周圍、股溝或腋下）
 - 瘙癢通常在晚上會加重。
- 皮膚上出現紅疹塊、痘痘、疙瘩、皮疹、水泡和短小深印



疥瘡



預防

降低您的疥瘡發病幾率：

- 避免與已經診斷患有疥瘡的人員進行身體接觸。
- 穿戴乾淨衣物，請勿與他人共享衣物或毛巾。
- 頻繁清洗床上用品和毛巾。
- 對所有地毯和襯墊家具吸塵。

檢測

您的健康照護提供者將在您的皮膚上塗抹一層礦物質油，刮取皮膚取樣，在顯微鏡下觀察樣本，以檢測您是否患有疥瘡。

治療

您的健康照護提供者將開具可以治療疥瘡的藥物乳液。該乳液需要留在身上長達8至14小時，然後洗去。

衣物、床上用品和毛巾應當採用洗衣機清洗，並使用熱風烘乾機烘乾。無法清洗的任何其他物品應當使用塑料袋密封至少72小時。

治療理由

若不治療，這一區域將持續瘙癢。長期對感染區撓癢可導致其他嚴重的皮膚感染。

性伴侶和家庭成員

您在過去六週內的性伴侶和親密伴侶也需要接受檢查和治療，以確保他們不會再次感染您或他人。家庭成員（包括兒童）也應接受治療，即使他們尚未呈現症狀。

疥瘡和妊娠

我們尚不知曉在妊娠期間患有疥瘡的任何嚴重影響。某些用於治療疥瘡的藥物乳液可能會對胎兒有害，因此您在妊娠或哺乳期間，若要治療疥瘡，請告知您的健康照護提供者。

紐約市性健康診所提供機密且免費或廉價服務，包括STI和HIV檢測。

如需查找一家診所，請造訪：
nyc.gov/health/clinics。