

# 梅毒

梅毒是一種透過陰道性交、肛交和口交傳播的細菌性感染。它還可以由妊娠婦女在懷孕期間傳染給寶寶。如果口腔或嘴唇上有梅毒瘡口，則梅毒可以透過親吻傳播。

## 症狀

大部分患有梅毒的人群從未注意到任何症狀。症狀包括：

- 在性交期間，暴露在外的皮膚（生殖器、肛門、口腔）上可能會生長被稱之為下疳的無痛瘡口
- 皮疹，特別是在手掌或腳掌上
- 局部區域掉髮、發燒、淋巴腺體腫脹、體重減少、肌肉疼痛和疲勞



# 梅毒



## 預防

避孕套和牙齒隔離障可以預防梅毒的傳播，但僅限於它們遮蓋下疳（瘡口）的情況下。擁有多名伴侶會增加您感染或傳播性傳播感染(STI)的風險，包括梅毒。

## 檢測

您的健康照護提供者將透過血樣檢測梅毒。

## 治療

梅毒的症狀最終會在治療或不治療時消除，但未經治療時，感染仍舊存留在體內，可能會持續造成傷害。

梅毒的最佳治療方式是注射抗生素。您的健康照護提供者將負責注射至少一劑藥（有時可能會注射高達三劑藥）。需要進行全面治療以清除感染，因此完成治療是尤為重要的。您應在三個月後進行複查，確保感染已被清除。

## 治療理由

若不治療，梅毒會一直存留在體內。即使症狀消除，梅毒仍舊可以危害您的心臟、大腦和神經系統，並最終導致死亡。

患有梅毒還更易染上或傳播 HIV。

## 性伴侶

您的性伴侶也需得到治療，以確保他們不會患上嚴重疾病，再次傳染您或他人。您應當將您的感染情況告知過去3至12個月間的所有性伴侶，使其能夠接受檢查。您的健康照護提供者將幫您決定您應當聯絡哪些伴侶。

## 梅毒和妊娠

所有妊娠人員應當在孕期盡早檢測是否患有梅毒和其他STI，包括HIV。患有梅毒的妊娠人員可在孕期將感染傳給寶寶。這被稱為胎傳梅毒。胎傳梅毒可引發死胎、早產、嬰兒出生時體重過低，或在出生不久後死亡。

紐約市性健康診所提供機密且免費或廉價服務，包括STI和HIV檢測。

如需查找一家診所，請造訪：  
[nyc.gov/health/clinics](https://nyc.gov/health/clinics)。