

Syphilis

La syphilis est une infection bactérienne qui se transmet par les relations sexuelles vaginales, anales ou orales. Une femme enceinte peut également la transmettre à son bébé pendant la grossesse. La syphilis peut être transmise en embrassant si des lésions de syphilis sont présentes dans la bouche ou sur les lèvres.

Symptômes

La plupart des personnes atteintes de syphilis ne remarquent jamais aucun symptôme. Les symptômes comprennent :

- des lésions ouvertes indolores appelées chancres, pouvant apparaître sur la peau exposée pendant les rapports sexuels (organes génitaux, anus, bouche) ;
- une éruption cutanée, en particulier sur la paume des mains ou la plante des pieds ;
- une perte de cheveux par endroits, de la fièvre, des ganglions lymphatiques gonflés, une perte de poids, des douleurs musculaires et de la fatigue.



Syphilis



Prévention

Les préservatifs et les digues dentaires peuvent empêcher la transmission de la syphilis, mais uniquement s'ils recouvrent le chancre (lésion). Le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuel(le)s augmente votre risque de contracter des infections sexuellement transmissibles (IST) comme la syphilis.

Dépistage

Votre prestataire de soins de santé dépistera la syphilis avec un échantillon de sang.

Traitement

Les symptômes de la syphilis finissent par disparaître avec ou sans traitement, mais sans traitement, l'infection reste dans l'organisme et peut continuer à causer des dommages.

Une injection d'antibiotiques est le meilleur traitement contre la syphilis. Votre prestataire de soins de santé administrera au moins une injection (parfois jusqu'à trois injections). Le traitement complet est nécessaire pour éliminer l'infection. Il est donc

important de prendre le traitement jusqu'au bout. Vous devriez vous faire dépister à nouveau après trois mois pour vous assurer que l'infection a disparu.

Pourquoi se faire traiter

Si elle n'est pas traitée, la syphilis reste dans l'organisme. Même si les symptômes disparaissent, la syphilis peut endommager votre cœur, votre cerveau et votre système nerveux et finalement entraîner la mort.

La syphilis accroît également le risque d'être infecté(e) par le VIH ou de le transmettre.

Partenaires sexuel(le)s

Vos partenaires sexuel(le)s doivent également être traité(e)s pour éviter de développer de graves problèmes de santé, de vous réinfecter ou de transmettre l'infection à d'autres personnes. Vous devez informer de votre infection tout(e)s les partenaires sexuel(le)s que vous avez eu(e)s au cours des trois à 12 derniers mois afin qu'ils ou elles puissent être examiné(e)s. Votre prestataire de soins de santé vous aidera à déterminer quel(le)s partenaires vous devriez contacter.

Syphilis et grossesse

Toutes les femmes enceintes doivent se faire dépister pour la syphilis et d'autres IST, dont le VIH, le plus tôt possible.

Une femme enceinte atteinte de syphilis peut transmettre l'infection à son bébé pendant la grossesse. C'est ce qu'on appelle la syphilis congénitale. La syphilis congénitale peut causer la mort à la naissance, une naissance prématurée, un faible poids de naissance ou la mort peu de temps après la naissance.

Les cliniques de santé sexuelle de la ville de New York proposent des services confidentiels, à bas prix ou gratuits, y compris des dépistages des IST et du VIH.

Pour trouver une clinique, consultez [nyc.gov/health/clinics](https://www.nyc.gov/health/clinics).