

Trichomonase

La trichomonase est une infection parasitaire qui se transmet par les relations sexuelles vaginales.

Symptômes

La plupart des personnes atteintes de trichomonase n'ont aucun symptôme. Si des symptômes apparaissent, ils peuvent comprendre un écoulement vaginal grisâtre ou jaune verdâtre, ou des démangeaisons ou irritations à l'intérieur ou autour du vagin.



Trichomonase



Prévention

Les préservatifs et les digues dentaires peuvent empêcher la propagation de la trichomonase. Le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuel(le)s augmente votre risque de contracter des infections sexuellement transmissibles (IST) comme la trichomonase.

Dépistage

Votre prestataire de soins de santé prélèvera un échantillon de liquide de votre vagin à l'aide d'un écouvillon pour l'analyser.

Traitement

La trichomonase peut être éliminée avec des comprimés. Le traitement complet est nécessaire pour éliminer l'infection. Il est donc important de prendre tous les médicaments,

même si vous vous sentez mieux. Vous devriez vous faire dépister à nouveau après trois à quatre mois pour vous assurer que l'infection a disparu.

Pourquoi se faire traiter

La trichomonase augmente également le risque d'être infecté(e) par le VIH ou de le transmettre.

Partenaires sexuel(le)s

Vos partenaires sexuel(le)s doivent être traité(e)s pour éviter de développer de graves problèmes de santé, de vous réinfecter ou de transmettre l'infection à d'autres personnes. Vous devez informer de votre infection tou(te)s les partenaires sexuel(le)s que vous avez eu(e)s au cours des deux

derniers mois, afin qu'ils ou elles puissent être examiné(e)s et traité(e)s.

Trichomonase et grossesse

La trichomonase peut causer un accouchement prématuré et un faible poids de naissance.

Les cliniques de santé sexuelle de la ville de New York proposent des services confidentiels, à bas prix ou gratuits, y compris des dépistages des IST et du VIH.

Pour trouver une clinique, consultez nyc.gov/health/clinics.