

Tricomoniasis

La tricomoniasis es una infección parasitaria que se contagia a través del sexo vaginal.

Síntomas

La mayoría de las personas con tricomoniasis no tienen síntomas. Cuando sí se presentan síntomas, estos incluyen flujo vaginal grisáceo o verde-amarillento, o picazón o irritación dentro y alrededor de la vagina.



Tricomoniasis



Prevención

Los preservativos y las barreras bucales pueden evitar el contagio de la tricomoniasis. Tener varias parejas sexuales aumenta el riesgo de contagiarse infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la tricomoniasis.

Pruebas de detección

Su proveedor de atención de salud hisopará la vagina para examinar una muestra de flujo.

Tratamiento

La tricomoniasis puede curarse con pastillas. Se necesita realizar el tratamiento completo para eliminar la infección, por lo que es importante tomar todos los medicamentos, incluso si se siente mejor.

Debe volver a hacerse una prueba de detección después de tres a cuatro meses para asegurarse de que la infección ya no está.

Por qué recibir tratamiento

Tener tricomoniasis aumenta la probabilidad de contagiarse o transmitir VIH.

Parejas sexuales

Sus parejas sexuales también deben tratarse para no desarrollar enfermedades graves, reinfectarlo a usted o transmitir la infección a otras personas. Debe informar a todas las parejas sexuales que haya tenido durante los dos meses anteriores al resultado que usted tiene una infección para que puedan someterse a una evaluación y tratamiento.

Tricomoniasis y embarazo

La tricomoniasis puede ocasionar un parto prematuro y un bajo peso al nacer del bebé.

Las Clínicas de Bienestar Sexual de la ciudad de Nueva York proporcionan servicios gratuitos o con un bajo costo y de manera confidencial, entre los que se incluyen pruebas de detección de ITS y VIH.

Para encontrar una clínica, visite nyc.gov/health/clinics.