

Urétrite

L'urétrite est une inflammation (irritation) de la paroi de l'urètre (le canal qui permet d'évacuer l'urine de l'organisme).

L'urétrite peut être le signe d'une infection sexuellement transmissible (IST). Les infections de l'urètre incluent la chlamydia et la gonorrhée.

Symptômes

Certaines personnes atteintes d'urétrite n'ont aucun symptôme. Si des symptômes apparaissent, ils peuvent inclure :

- des brûlures ou des douleurs au moment d'uriner ;
- un écoulement transparent ou blanc du pénis ;
- des douleurs et un gonflement du scrotum (testicules).



Urétrite



Prévention

Les préservatifs peuvent empêcher la propagation des IST reconnues comme responsables de l'urétrite, comme la chlamydia et la gonorrhée.

Dépistage

Votre prestataire de soins de santé peut diagnostiquer l'urétrite à l'aide d'un échantillon d'urine ou en prélevant du liquide à l'extrémité du pénis avec un écouvillon.

Traitement

Votre prestataire de soins de santé peut vous prescrire des antibiotiques pour traiter les IST responsables de l'urétrite.

Pourquoi se faire traiter

Si elle n'est pas traitée, l'urétrite causée par une IST peut engendrer des douleurs sévères, la stérilité (incapacité à avoir des enfants) et des testicules douloureux ou gonflés. L'urétrite augmente également le risque d'être infecté(e) par le VIH ou de le transmettre.

Partenaires sexuel(le)s

Si votre urétrite est causée par une IST, vos partenaires sexuel(le)s doivent être traité(e)s pour éviter de développer de graves problèmes de santé, de vous réinfecter ou de transmettre l'infection à d'autres personnes. Vous devez informer de votre infection tou(te)s les partenaires sexuel(le)s que vous avez eu(e)s au cours des deux derniers mois, afin qu'ils ou elles puissent être examiné(e)s et traité(e)s.

Les cliniques de santé sexuelle de la ville de New York proposent des services confidentiels, à bas prix ou gratuits, y compris des dépistages des IST et du VIH.

Pour trouver une clinique, consultez nyc.gov/health/clinics.