

# Уретрит

Уретрит — это воспаление (раздражение) слизистой оболочки уретры (канала, по которому моча выводится из организма). Уретрит может указывать на наличие инфекций, передающихся половым путем (ИППП). К инфекциям уретры относятся хламидиоз и гонорея.

## Симптомы

У некоторых людей с уретритом он протекает бессимптомно. Если симптомы возникают, в их число могут входить:

- ощущения жжения или боли при мочеиспускании;
- прозрачные или белые выделения из полового члена;
- боль и отек мошонки (яичек).



# Уретрит



## Профилактика

Использование презервативов может предотвратить распространение ИППП, вызывающих уретрит — хламидиоза и гонореи.

## Тестирование

Поставщики медицинских услуг диагностируют уретрит с помощью анализа мочи или мазка выделений из полового члена.

## Лечение

Для лечения ИППП, вызвавших уретрит, поставщик медицинских услуг может выписать антибиотики.

## Зачем необходимо лечение

При отсутствии лечения вызванный ИППП уретрит может привести к сильным болям, бесплодию (неспособности иметь детей), боли и отеку яичка. Наличие уретрита также повышает вероятность заражения или распространения ВИЧ.

## Половые партнеры

Если уретрит вызван ИППП, вашим половым партнерам также нужно пройти лечение, чтобы избежать возникновения серьезных проблем со здоровьем, вашего повторного заражения или распространения инфекции. Вы должны сообщить о наличии инфекции всем своим половым партнерам за последние два месяца, чтобы они тоже получили возможность осмотра и лечения.

Клиники сексуального здоровья г. Нью-Йорк предоставляют конфиденциальные недорогие или бесплатные услуги, включая тестирование на ИППП и ВИЧ.

Чтобы найти клинику, посетите [nyc.gov/health/clinics](http://nyc.gov/health/clinics).