

# 念珠菌(酵母菌) 感染

酵母菌微生物自然生長於生殖器官區域。酵母菌感染是由於陰道內部或陰莖上有過多的酵母菌微生物所引發的。酵母菌感染儘管可以透過性伴侶傳播，但不被認為是一種性傳播感染(STI)，因為它在沒有性行為時也可發生。



# 酵母菌 感染



## 症狀

陰道症狀包括：

- 瘙癢
- 疼痛
- 灼燒
- 粘稠分泌物（類似於茅屋乳酪）

陰莖症狀包括：

- 瘙癢
- 皮疹

## 檢測

健康照護提供者透過拭子在陰道取樣後進行檢測，以查看陰道內部是否有酵母菌感染。他們透過目測檢查來診斷陰莖是否有酵母菌感染。

## 治療

陰道的酵母菌感染可透過片劑或置於陰道內的藥物進行治療，例如：藥膏或栓劑。陰莖的酵母菌感染可透過片劑或外用於陰莖的藥膏進行治療。許多這類治療方法無需開具處方。

## 治療理由

若不治療，酵母菌感染可造成不適。

## 性伴侶

性伴侶無需針對酵母菌感染接受治療。

## 酵母菌感染和妊娠

我們尚不知曉在妊娠期間患有酵母菌感染的任何嚴重影響。

紐約市性健康診所提供機密且免費或廉價服務，包括STI和HIV檢測。

如需查找一家診所，請造訪：  
[nyc.gov/health/clinics](https://nyc.gov/health/clinics)。