

Infection à Candida (levures)

Les levures existent naturellement dans la région génitale. Une infection à levures est causée par une présence trop importante de levures dans la vagin ou sur le pénis. Bien qu'elle puisse se transmettre entre partenaires sexuel(le)s, une infection à levures n'est pas considérée comme une infection sexuellement transmissible (IST), car elle peut survenir sans avoir de rapports sexuels.



Infection à levures



Symptômes

Les symptômes vaginaux comprennent :

- des démangeaisons ;
- des douleurs ;
- des brûlures ;
- un écoulement épais (similaire à du lait caillé).

Les symptômes péniers comprennent :

- des démangeaisons ;
- une éruption cutanée.

Dépistage

Les prestataires de soins de santé dépistent les infections à levures dans le vagin en y prélevant un échantillon à analyser à l'aide d'un écouvillon. Ils diagnostiquent les infections à levures du pénis par examen visuel.

Traitement

Les infections à levures du vagin peuvent être éliminées avec des comprimés ou des traitements insérés dans le vagin, comme des crèmes ou des suppositoires. Les infections à levures du pénis peuvent être éliminées avec des comprimés ou des crèmes appliquées sur le pénis. Nombre de ces traitements sont disponibles sans ordonnance.

Pourquoi se faire traiter

Si elles ne sont pas traitées, les infections à levures peuvent entraîner une gêne.

Partenaires sexuel(le)s

Les partenaires sexuel(le)s n'ont pas besoin d'être traité(e)s pour des infections à levures.

Infection à levures et grossesse

Nous n'avons pas connaissance de conséquences graves d'une infection à levures pendant la grossesse.

Les cliniques de santé sexuelle de la ville de New York proposent des services confidentiels, à bas prix ou gratuits, y compris des dépistages des IST et du VIH.

Pour trouver une clinique, consultez nyc.gov/health/clinics.