علاج لمدة شهر لعدوى السل الكامن: معلومات حول آيزونيازيد وريفابنتين للمرضى

يتكون نظام علاج عدوى السل الكامن (Latent Tuberculosis, TB) الذي يستمر لمدة شهر واحد من دواءين، وهما **آيزونيازيد** و**ريفابنتين**، ويتوفران في شكل أقراص منفصلة يتناولها المريض معًا.

- تناول الأقراص عن طريق الفم يوميًا لمدة 28 يومًا.
- تناول من أربعة إلى ستة أقراص يوميًا حسب الجرعة الموصوفة لك.
- تناول جميع الأقراص معًا في الوقت نفسه يوميًا مع الطعام.

مَن لا يمكنه تناول آيزونيازيد وريفابنتين؟

سيخبرك مقدِّم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان بإمكانك تناول آيزونيازيد وريفابنتين. لن يمكنك تناول هذين الدواءين في الحالات التالية:

- إذا كان عمرك أقل من 13 عامًا أو وزنك أقل من 66 رطلًا (30 كيلوغرامًا).
- إذا كنت تتلقى حاليًا علاجًا مضادًا للفيروسات القهقرية عالي الفعالية لفيروس نقص المناعة البشرية (Human Immunodeficiency Virus, HIV).
- إذا كنتِ حاملًا أو تخططين للحمل أو ترضعين.
- إذا تأكدت إصابتك بمرض TB النشط أو كان يُشتبه في إصابتك به.

ما الذي عليَّ فعله إذا كنت أتناول أدوية أخرى أو أتلقى علاجًا لحالات مرضية أخرى؟

أخبر مقدِّم الرعاية الصحية الخاص بك في الحالات التالية:

- إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى، بما يشمل الأدوية العشبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والفيتامينات ووسائل تحديد النسل.
- إذا كنت مصابًا بأي أمراض أو حالات مرضية أخرى أو تتلقى علاجًا لأي أمراض أو حالات مرضية أخرى.

ما الذي ينبغي لي أن أعرفه أيضًا عن آيزونيازيد وريفابنتين؟

- **لا** تتناول أي أدوية تحتوي على أسيتامينوفين (مثل Tylenol) ولا تشرب الكحول في أثناء تناول آيزونيازيد وريفابنتين.
- قد يحتوي ريفابنتين على كميات صغيرة من الشوائب تُسمَّى نيتروزامينات، وتوجد عادةً في الماء والطعام. ومع ذلك، فإن فوائد تناول ريفابنتين أكثر من المخاطر التي قد تتسبب فيها هذه الشوائب.
- تحدَّث إلى مقدِّم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن تناول آيزونيازيد وريفابنتين.

ما الآثار الجانبية لآيزونيازيد وريفابنتين؟

أخبر مقدِّم الرعاية الصحية الخاص بك إذا ظهر عليك أي من الآثار الجانبية التالية:

- الدوار
- الشعور بالغثيان
- القيء
- التعب (الشعور بالإرهاق)
- الطفح الجلدي
- فقدان الشهية
- الآلام في العضلات أو المفاصل
- الحمى
- احمرار لون الدموع أو العرق أو البول
- الشعور بألم أو عدم الراحة في المعدة
- انخفاض تعداد خلايا الدم
- ارتفاع نتائج اختبارات وظائف الكبد

أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

اتصل بـ TB Chest Center (مركز علاج الصدر نتيجة الإصابة بمرض السل) في المنطقة التي تتلقى فيها الرعاية:

- **Corona:** 718-396-5134
- **Morrisania:** 718-838-6876
- **Fort Greene:** 718-249-1468

للمزيد من المعلومات حول مرض TB، قُم بزيارة الرابط nyc.gov/health/tb.

Arabic 1.25