

Traitement d'un mois pour l'infection tuberculeuse latente : Informations pour les patients sur l'isoniazide et la rifapentine

Le programme de traitement d'un mois pour l'infection tuberculeuse (tuberculosis, TB) latente comprend deux médicaments, l'**isoniazide** et la **rifapentine**, qui sont deux comprimés distincts pris ensemble.

- Prenez les comprimés par voie orale (par la bouche) tous les jours pendant 28 jours.
- Prenez quatre à six comprimés par jour, en fonction de la dose qui vous a été prescrite.
- Prenez tous les comprimés en même temps chaque jour avec de la nourriture.

Qui ne peut pas prendre de l'isoniazide et de la rifapentine ?

Votre prestataire de soins de santé vous indiquera si vous pouvez prendre de l'isoniazide et de la rifapentine. Vous ne pourrez pas prendre ces médicaments si vous :

- Avez moins de 13 ans ou pesez moins de 66 livres (30 kilogrammes).
- Recevez actuellement une thérapie antirétrovirale extrêmement active pour le VIH.
- Êtes enceinte, prévoyez de tomber enceinte, ou allaitez votre bébé.
- Avez une tuberculose active présumée ou confirmée.

Que se passe-t-il si je prends d'autres médicaments ou si je reçois un traitement pour d'autres problèmes médicaux ?

Indiquez à votre prestataire de soins de santé si vous :

- Prenez d'autres médicaments, notamment des médicaments à base de plantes, des médicaments en vente libre (sans ordonnance), des vitamines ou un traitement contraceptif.
- Avez d'autres maladies ou problèmes médicaux, ou recevez un traitement pour toute autre maladie ou tout autre problème de santé.

Que dois-je savoir d'autre sur l'isoniazide et la rifapentine ?

- **Ne** prenez **pas** de médicaments qui contiennent de l'acétaminophène (Tylenol) et ne buvez pas d'alcool pendant que vous prenez de l'isoniazide ou de la rifapentine.
- La rifapentine peut contenir de petites quantités d'impuretés appelées « nitrosamines », qui sont souvent trouvées dans l'eau et la nourriture. Cependant, les avantages de prendre de la rifapentine sont supérieurs aux risques qui pourraient découler de ces impuretés.
- Adressez-vous à votre prestataire si vous avez des inquiétudes concernant la prise d'isoniazide ou de rifapentine.

Quels sont les effets secondaires de l'isoniazide et de la rifapentine ?

Contactez votre prestataire de soins de santé si vous souffrez de l'un ou plusieurs des effets secondaires suivants :

- Vertiges
- Nausée
- Vomissements
- Fatigue
- Éruption cutanée
- Perte d'appétit
- Douleurs musculaires ou articulaires
- Fièvre
- Larmes, sueur ou urine rouges
- Douleurs ou gêne abdominales
- Diminution du nombre de globules sanguins
- Résultats élevés de tests de la fonction hépatique

Où puis-je trouver des informations supplémentaires ?

Appelez le TB Chest Center (centre de pneumologie pour la tuberculose) où vous recevez actuellement des soins :

- **Corona** : 718-396-5134
- **Morrisania** : 718-838-6876
- **Fort Greene** : 718-249-1468

Pour en savoir plus sur la tuberculose, consultez nyc.gov/health/tb.