Cura di un mese per infezione da tubercolosi latente: informazioni per i pazienti su isoniazide e rifapentina

Il regime di cura di un mese per l'infezione da tubercolosi (tubercolosis, TB) latente consiste in due farmaci — **isoniazide** e **rifapentina** — che devono essere assunti assieme in due compresse separate.

- Assumere le compresse per via orale ogni giorno per 28 giorni.
- È possibile assumere fino a sei compresse al giorno, a seconda del dosaggio indicato dal medico.
- Assumere tutte le compresse ogni giorno alla stessa ora a stomaco pieno.

Chi non deve assumere isoniazide e rifapentina?

Il medico comunicherà al paziente se può assumere isoniazide e rifapentina. Si tratta di farmaci non adatti per:

- bambini di età inferiore a 13 anni o di peso inferiore a 30 kg (66 libbre);
- chi è attualmente in terapia retrovirale altamente attiva per la cura del virus dell'immunodeficienza umana (Human Immunodeficiency Virus, HIV);
- chi è in gravidanza, sta programmando una gravidanza o sta allattando al seno;
- chi ha una malattia tubercolare in corso, confermata o sospetta.

Che cosa deve fare chi sta assumendo altri farmaci o è in cura per altre patologie?

Il paziente deve consultare il medico se:

- sta assumendo altri farmaci, compresi quelli a base di erbe, quelli da banco (non soggetti a prescrizione medica), vitamine e anticoncezionali;
- soffre di qualsiasi altra patologia o disturbo o è in cura per altre patologie o disturbi.

Che cos'altro si deve sapere su isoniazide e rifapentina?

- Durante il trattamento con isoniazide e rifapentina **non** si devono assumere altri farmaci contenenti acetaminofene (Tylenol) né bere alcol.

- La rifapentina può contenere piccole quantità di impurità chiamate nitrosammine, che si trovano spesso nell'acqua e nel cibo. I vantaggi della rifapentina sono tuttavia molto maggiori dei rischi che potrebbero derivare dalla presenza di queste impurità.
- In caso di dubbi circa l'assunzione di isoniazide e rifapentina rivolgersi al medico.

Quali sono gli effetti collaterali di isoniazide e rifapentina?

In presenza di uno dei seguenti effetti collaterali è bene rivolgersi al medico:

- vertigini
- nausea
- vomito
- affaticamento (sensazione di stanchezza)
- eruzioni cutanee
- perdita di appetito
- dolori muscolari o articolari
- febbre
- lacrime, sudore o urina di colore rossastro
- dolore o fastidio allo stomaco
- basso numero di cellule del sangue
- valori elevati dei test di funzionalità epatica

A chi rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni?

Il paziente deve contattare il TB Chest Center presso il quale è stato curato:

- **Corona:** 718-396-5134
- **Morrisania:** 718-838-6876
- **Fort Greene:** 718-249-1468

Per ulteriori informazioni sulla TB visitare nyc.gov/health/tb.

1.25 Italian