

Jednomiesięczne leczenie utajonego zakażenia gruźlicą: informacje o izoniazydzie i ryfapentynie dla pacjentów

Jednomiesięczny schemat leczenia utajonego zakażenia gruźlicą (tuberculosis, TB) obejmuje dwa leki — **izoniazyd** i **ryfapentynę** — dostępne w postaci oddzielnych pigułek, które należy przyjmować razem.

- Pigułki należy zażywać doustnie codziennie przez 28 dni.
- Należy zażywać od czterech do sześciu pigułek dziennie, w zależności od przepisanej dawki.
- Wszystkie pigułki należy zażywać podczas posiłku codziennie o tej samej porze.

Kto nie może zażywać izoniazydu i ryfapentyny?

O tym, czy możesz zażywać izoniazyd i ryfapentynę, poinformuje Cię usługodawca opieki zdrowotnej. Nie możesz zażywać tych leków, jeśli:

- masz mniej niż 13 lat lub ważysz mniej niż 66 funtów (30 kg);
- jesteś w trakcie wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej na HIV;
- jesteś w ciąży, planujesz zajść w ciążę lub karmisz piersią;
- potwierdzono u Ciebie lub podejrzewa się aktywną gruźlicę.

Co zrobić, jeśli zażywam inne leki lub jestem w trakcie leczenia innych schorzeń?

Poinformuj swojego lekarza, jeżeli:

- przyjmujesz jakiegokolwiek inne leki, w tym leki ziołowe, leki dostępne bez recepty, witaminy i środki antykoncepcyjne;
- masz inne choroby lub schorzenia albo jesteś w trakcie leczenia innych chorób lub schorzeń.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o izoniazydzie i ryfapentynie?

- **Nie** należy przyjmować żadnych leków zawierających paracetamol/acetaminofen (Tylenol) ani pić alkoholu podczas przyjmowania izoniazydu i ryfapentyny.
- Ryfapentyna może zawierać niewielkie ilości zanieczyszczeń zwanych nitrozoaminami, które często występują w wodzie i żywności. Korzyści płynące

ze stosowania ryfapentyny przewyższają jednak ryzyko, jakie mogą nieść ze sobą te zanieczyszczenia.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zażywania izoniazydu i ryfapentyny należy porozmawiać z lekarzem.

Jakie są skutki uboczne izoniazydu i ryfapentyny?

Poinformuj lekarza w razie zaobserwowania następujących skutków ubocznych:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| • zawroty głowy; | • brak apetytu; | • ból lub dyskomfort |
| • nudności; | • bóle mięśni lub | brzucha; |
| • wymioty; | stawów; | • niska liczba krwinek; |
| • poczucie zmęczenia; | • gorączka; | • podwyższone wyniki |
| • wysypka; | • czerwone łzy, pot lub | testów czynnościowych |
| | mocz; | wątroby. |

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do Centrum chorób układu oddechowego leczonego gruźlicę, w którym uzyskujesz opiekę:

- **Corona:** 718-396-5134
- **Morrisania:** 718-838-6876
- **Fort Greene:** 718-249-1468

W celu uzyskania dodatkowych informacji o gruźlicy odwiedź stronę nyc.gov/health/tb.

1.25 Polish