

Лечение латентной туберкулезной инфекции в течение одного месяца: информация для пациентов о Isoniazid и Rifapentine

Режим лечения латентной туберкулезной инфекции (ТБ) в течении одного месяца состоит из принимаемых вместе двух препаратов — **isoniazid** и **rifapentine**, которые выпускаются в виде отдельных таблеток.

- Принимайте таблетки перорально (через рот) ежедневно в течение 28 дней.
- Принимайте от четырех до шести таблеток в день, в зависимости от назначенной вам дозы.
- Принимайте все таблетки в одно и то же время каждый день вместе с едой.

Кому нельзя принимать isoniazid и rifapentine?

Ваш поставщик медицинских услуг должен сообщить вам, можно ли вам принимать isoniazid и rifapentine. Вы не можете принимать эти лекарства, если вы:

- моложе 13 лет или весите меньше 66 паундов (30 килограмм);
- в настоящее время проходите высокоактивную антиретровирусную терапию от ВИЧ инфекции;
- беременны, планируете беременность или кормите грудью;
- имеете подтвержденное или подозреваемое заболевание туберкулезом в активной фазе.

Что, если я принимаю другие лекарства или лечусь от других заболеваний?

Сообщите своему поставщику, если вы:

- принимаете другие лекарства, в том числе лекарства на основе трав, безрецептурные лекарства, витамины и противозачаточные средства;
- имеете другие заболевания или медицинские показания, либо проходите лечение в связи с каким-либо заболеванием или медицинским показанием.

Что еще мне следует знать о isoniazid и rifapentine?

- Во время приема isoniazid and rifapentine **не** принимайте какие-либо лекарства, содержащие ацетоминофен (Tylenol) и не употребляйте алкоголь.

- Rifapentine может содержать небольшое количество примесей, называемых нитрозамины, которые часто обнаруживают в воде и пище. Однако польза от приема rifapentine превосходит риск, который могут представлять эти примеси.
- Поговорите с вашим поставщиком, если у вас есть какие-либо опасения по поводу приема isoniazid и rifapentine.

Какие побочные эффекты вызывают isoniazid и rifapentine?

Свяжитесь со своим поставщиком, если у вас возник любой из этих побочных эффектов:

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|
| • Головокружение | • Боль в мышцах или суставах | • Пониженное количество белых кровяных клеток |
| • Тошнота | • Жар | • Повышение уровня печеночных ферментов |
| • Рвота | • Слезы, пот или моча с кровью | |
| • Утомляемость (чувство усталости) | • Боль в животе или дискомфорт | |
| • Кожная сыпь | | |
| • Потеря аппетита | | |

Где я могу найти дополнительную информацию?

Позвоните в Центр заболеваний грудной клетки и туберкулеза, где вы проходите лечение:

- **Corona:** 718-396-5134
- **Morrisania:** 718-838-6876
- **Fort Greene:** 718-249-1468

Для получения дополнительной информации о ТБ посетите сайт nyc.gov/health/tb.

1.25 Russian