



针对潜伏性结核感染的一个月疗程： 关于异烟酸酏和利福平的患者须知

针对潜伏性结核病 (TB) 感染的一个月疗程由两种药物组成：异烟酸酏 (**isoniazid**) 和利福平 (**rifapentine**)。两种药物各取一片，一起服用。

- 须每日口服（经口腔服下），连续服用 **28** 天。
- 每日服用 **4** 至 **6** 片，具体数量取决于医生开具的处方剂量。
- 所有药片须在每日同一时间随餐食服下。

谁不能服用异烟酸酏和利福平？

您的医疗保健提供者会告知您是否可以服用异烟酸酏和利福平。如果您有下列情况，则不能服用这两种药物：

- 年龄不满 **13** 岁或体重不足 **66** 磅（**30** 公斤）
- 目前正针对 **HIV** 接受高强度抗逆转录病毒治疗
- 已怀孕、计划怀孕或正在哺乳
- 确诊或疑似患有活动性结核病

如果我正在服用其他药物或正在针对其他病况接受治疗，该怎么办？

如果您有以下情况，请告知您的医疗保健提供者：

- 正在服用任何其他药物，包括草药、开架（非处方）药、维生素和避孕药
- 有任何其他疾病或病况，或针对任何其他疾病或病况正在接受治疗

关于异烟酸酏和利福平，我还应该知道什么？

- 服用异烟酸酏和利福平时，**不要**服用任何含有乙酰胺酚 (**acetaminophen (Tylenol)**) 的药物或饮酒。
- 利福平可能含有少量名为亚硝胺 (**nitrosamines**)、通常存在于水和食物中的杂质。然而，服用利福平的益处大于这些杂质可能带来的风险。
- 如果您对服用异烟酸酏和利福平有任何疑问，请与您的医疗保健提供者沟通。

异烟酸酐和利福平的副作用有哪些？

如果您有任何下列副作用反应，请联系您的医疗保健提供者：

- 头晕
- 恶心
- 呕吐
- 疲劳（感觉疲倦）
- 出皮疹
- 食欲不振
- 肌肉或关节疼痛
- 发烧
- 泪液、汗液或尿液发红
- 胃疼或胃部不适
- 血细胞含量偏低
- 肝功能指标升高

我在哪里可以获取更多信息？

请致电您接受治疗的结核病胸科中心：

- **Corona:** 718-396-5134
- **Morrisania:** 718-838-6876
- **Fort Greene:** 718-249-1468

如需更多结核病相关信息，请访问 nyc.gov/health/tb。

1.25 Simplified Chinese