



Tratamiento de un mes para la infección de tuberculosis latente: Información para pacientes sobre isoniazida y rifapentina

El régimen de tratamiento de un mes para la infección latente de tuberculosis (TB) consiste de dos medicamentos - **isoniazida** y **rifapentina** - que vienen en píldoras separadas que se toman juntas.

- Tome las pastillas por vía oral (por la boca) todos los días durante 28 días.
- Tome de cuatro a seis pastillas al día, dependiendo de la dosis que le hayan recetado.
- Tome todas las pastillas a la misma hora todos los días con comida.

¿Quién no puede tomar isoniazida y rifapentina?

Su proveedor de atención de salud le dirá si puede tomar isoniazida y rifapentina. No podrá tomar estos medicamentos si usted:

- Es menor de 13 años o pesa menos de 30 kilogramos (66 libras)
- Está recibiendo actualmente una terapia antirretroviral altamente activa para el VIH
- Está embarazada, planea quedarse embarazada o está amamantando
- Tiene tuberculosis activa confirmada o sospechada

¿Qué ocurre si estoy tomando otros medicamentos o recibiendo tratamiento para otras condiciones?

Dígale a su proveedor si

- Está tomando cualquier otro medicamento, incluidos medicamentos a base de hierbas, medicamentos de venta libre (sin receta), vitaminas y métodos anticonceptivos.
- Tiene alguna otra enfermedad o condición o está recibiendo tratamiento para alguna otra enfermedad o condición

¿Qué más debo saber sobre la isoniazida y la rifapentina?

- **No** tome ningún medicamento que contenga acetaminofén (Tylenol) ni beba alcohol mientras esté tomando isoniazida y rifapentina.
- La rifapentina puede contener pequeñas cantidades de impurezas llamadas nitrosaminas, que suelen encontrarse en el agua y los alimentos. Sin embargo,

los beneficios de tomar rifapentina son mayores que los riesgos que pueden suponer estas impurezas.

- Hable con su médico si le preocupa tomar isoniazida y rifapentina.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la isoniazida y la rifapentina?

Si tiene alguno de estos efectos secundarios, contacte a su proveedor:

- Mareos
- Náuseas
- Vómitos
- Fatiga (sensación de cansancio)
- Erupción en la piel
- Pérdida de apetito
- Dolor muscular o articular
- Fiebre
- Lágrimas rojas, sudor u orina
- Dolor o malestar estomacal
- Recuento bajo de células sanguíneas
- Pruebas de función hepática elevadas

¿Dónde puedo obtener más información?

Llame al Centro de Tórax y Tuberculosis donde esté recibiendo atención médica:

- **Corona:** 718-396-5134
- **Morrisania:** 718-838-6876
- **Fort Greene:** 718-249-1468

Para más información sobre la TB, visite nyc.gov/health/tb.

1.25 Spanish