

針對潛伏性結核感染的一個月療程： 關於異菸酸酏和雷發平的患者須知

針對潛伏性結核病 (TB) 感染的一個月療程由兩種藥物組成：異菸酸酏 (**isoniazid**) 和雷發平 (**rifapentine**)。兩種藥物各取一片，一起服用。

- 須每日口服（經口腔服下），連續服用 **28** 天。
- 每日服用 **4** 至 **6** 片，具體數量取決於醫生開具的處方劑量。
- 所有藥片須在每日同一時間隨餐食服下。

誰不能服用異菸酸酏和雷發平？

您的健康照護提供者會告知您是否可以服用異菸酸酏和雷發平。如果您有下列情況，則不能服用這兩種藥物：

- 年齡不滿 **13** 歲或體重不足 **66** 磅（**30** 公斤）
- 目前正針對 **HIV** 接受高強度抗逆轉錄病毒治療
- 已懷孕、計劃懷孕或正在哺乳
- 確診或疑似患有活動性結核病

如果我正在服用其他藥物或正在針對其他病況接受治療，該怎麼辦？

如果您有以下情況，請告知您的健康照護提供者：

- 正在服用任何其他藥物，包括草藥、開架（非處方）藥、維他命和避孕藥
- 有任何其他疾病或病況，或針對任何其他疾病或病況正在接受治療

關於異菸酸酏和雷發平，我還應該知道什麼？

- 服用異菸酸酏和雷發平時，**不要**服用任何含有乙醯胺酚 (**acetaminophen (Tylenol)**) 的藥物或飲酒。
- 雷發平可能含有少量名為亞硝胺 (**nitrosamines**)、通常存在於水和食物中的雜質。然而，服用雷發平的益處大於這些雜質可能帶來的風險。
- 如果您對服用異菸酸酏和雷發平有任何疑慮，請與您的健康照護提供者溝通。

異菸酸酐和雷發平的副作用有哪些？

如果您有任何下列副作用反應，請聯絡您的健康照護提供者：

- 頭暈
- 噁心
- 嘔吐
- 疲勞（感覺疲倦）
- 出皮疹
- 食慾不振
- 肌肉或關節疼痛
- 發燒
- 淚液、汗液或尿液發紅
- 胃痛或胃部不適
- 血細胞含量偏低
- 肝功能指標升高

我在哪裡可以獲取更多資訊？

請致電您接受治療的結核病胸科中心：

- **Corona**：718-396-5134
- **Morrisania**：718-838-6876
- **Fort Greene**：718-249-1468

如需更多結核病相關資訊，請造訪 nyc.gov/health/tb。

1.25 Traditional Chinese