

Domande comuni su isoniazide e rifapentina

La mia terapia per l'infezione tubercolare

Il tuo operatore sanitario ti ha prescritto **isoniazide e rifapentina** come terapia per la tua infezione tubercolare (tuberculosis, TB). **Tale farmaco deve essere preso una volta a settimana per 12 settimane**, 5/10 minuti dopo il pasto. Isoniazide e rifapentina possono contribuire a prevenire l'attivarsi della malattia della tubercolosi in futuro, con conseguenze più gravi.

Il test della tubercolosi è positivo ma la radiografia del torace è normale. Mi sento bene. Devo iniziare a prendere isoniazide e rifapentina?

Sì. Anche se al momento ti senti bene, comunque nel tuo organismo sono presenti i batteri della tubercolosi. L'unico modo per debellare i batteri della tubercolosi nel tuo organismo è tramite l'assunzione dei farmaci.

Quali sono gli effetti collaterali di isoniazide e rifapentina?

La maggior parte delle persone non riporta alcun problema. Il farmaco rifapentina potrebbe colorare di un rosso/arancione le urine (la pipì), la saliva, le lacrime o il sudore. È normale. Il colore andrà via con il tempo.

Posso continuare a prendere gli altri farmaci, anche a base di erbe, le vitamine e gli integratori?

Dipende. Alcuni farmaci, vitamine e integratori si possono prendere in sicurezza durante l'assunzione di isoniazide e rifapentina. Altri invece non sono altrettanto sicuri. Parla con il tuo operatore sanitario, infermiere o farmacista degli altri farmaci che assumi, compresi i farmaci da banco, quelli con prescrizione medica (anche la pillola anticoncezionale), i farmaci a base di erbe, i farmaci tradizionali, le vitamine e gli integratori.

Esistono dei cibi o bevande che dovrei evitare quando prendo isoniazide e rifapentina?

Sì. Non bere alcol durante le 12 settimane di terapia. Assumere alcol insieme a isoniazide e rifapentina può causare danni al fegato.

Dovrebbero evitarsi quei cibi contenenti tiramina o istamina chimica, come il formaggio stagionato, il pesce, la carne stagionata o affumicata. Questi cibi potrebbero dare luogo a sintomi come arrossamenti cutanei, accelerazione cardiaca o palpitazioni, aumento della pressione del sangue o mal di testa. Parla con il tuo operatore sanitario per capire se devi seguire una dieta speciale.



Sospendi l'assunzione di isoniazide e rifapentina e chiama subito lo studio medico del tuo operatore sanitario se presenti uno dei seguenti effetti indesiderati:

- Disappetenza verso qualsiasi cibo
- Nausea o vomito
- Dolori allo stomaco
- Urine (pipì) scure (no rosse o arancioni)
- Feci di colore chiaro (feci/cacca)
- Diarrea
- Dolore al torace nella parte bassa o bruciore di stomaco
- Sintomi influenzali con o senza febbre
- Mal di testa o dolori muscolari
- Debolezza o stanchezza eccessiva
- Febbre o brividi
- Vertigini
- Pelle o occhi ingialliti
- Eruzioni cutanee o prurito
- Facile formazione di lividi o inspiegabili macchie della pelle rosse o violacee
- Facilità di sanguinamento, sangue dal naso o dalle gengive o intorno ai denti
- Respiro affannoso
- Dolore o formicolio alle mani, braccia, piedi o gambe
- Sentimento di tristezza o depressione

Se riporti effetti indesiderati, potrebbe essere possibile prendere un farmaco diverso come terapia dell'infezione tubercolare. In caso di dubbi, parla con il tuo operatore sanitario, infermiere o farmacista.

Domande comuni su **isoniazide e rifapentina**

La mia terapia per l'infezione tubercolare

Cosa devo fare se dimentico di prendere i farmaci?

Se sei ancora nella stessa settimana di terapia, prendi i farmaci secondo le istruzioni, appena lo ricordi. Se hai saltato una settimana intera, continua a prendere i farmaci secondo le istruzioni. Se hai dimenticato di prendere i farmaci chiama il tuo operatore sanitario per ricevere indicazioni.

Come faccio a ricordarmi di prendere i farmaci?

Prendi i farmaci una volta a settimana (per esempio, ogni lunedì a colazione). Esistono diversi modi per monitorare l'assunzione dei farmaci:

- ✔ Usa una tabella per la terapia farmacologica, come il diario dei farmaci per la tubercolosi, per registrare come e quando assumi i farmaci.
- ✔ Usa una applicazione (app) per avere un calendario sul tuo cellulare o computer e monitorare come e quando assumi i farmaci.
- ✔ Imposta una sveglia quotidiana per prendere i farmaci.
- ✔ Tieni i medicinali sempre nello stesso posto, come su un comodino vicino al letto.
- ✔ Usa un portapillole diviso per i giorni della settimana.
- ✔ Chiedi a un amico o a un familiare di ricordarti di prendere i medicinali.

Come devo conservare i farmaci isoniazide e rifapentina?

Conserva l'isoniazide e la rifapentina a temperatura ambiente. Non conservare questi farmaci in un luogo che potrebbe essere troppo freddo (come il frigorifero), troppo caldo (come vicino ai fornelli) o troppo umido (come nel mobiletto del bagno). Tienili lontano dai bambini. Per ulteriori informazioni, visita il sito nyc.gov/health e cerca "medicine safety" (sicurezza farmaceutica).

È possibile prescrivere isoniazide e rifapentina per più di 30 giorni alla volta?

Molto probabilmente il tuo operatore sanitario vorrà visitarti ogni mese mentre assumi isoniazide e rifapentina, per accertarsi che la terapia funzioni e discutere degli effetti indesiderati. Insieme al tuo operatore sanitario puoi decidere cosa sia meglio.

Posso diminuire la dose di farmaci se mi sento bene?

Posso interrompere prima la terapia?

No. È importante finire di prendere tutti i farmaci per la tubercolosi per eliminare al massimo dal tuo organismo i batteri che causano la tubercolosi. Se interrompi la terapia in anticipo, potresti comunque ammalarti in seguito. Parla con il tuo operatore sanitario prima di interrompere la terapia o diminuire la quantità di farmaci.

Quando posso smettere di assumere isoniazide e rifapentina?

Dopo che hai completato del tutto le 12 settimane previste per la terapia. Per problemi con l'assunzione dei farmaci, parla con il tuo operatore sanitario che ti aiuterà a completare la terapia.

Per eventuali domande o dubbi riguardanti la terapia per l'infezione tubercolare ti invitiamo a rivolgerti al tuo operatore sanitario. Per emergenze o peggioramento degli effetti indesiderati, contatta il tuo operatore sanitario o recati al più vicino pronto soccorso.

Informazioni di contatto dell'operatore sanitario/ambulatorio

Nome dell'operatore/ambulatorio

Numero telefonico:

Indirizzo:
