

Questions courantes concernant la rifampine

Mon traitement contre l'infection tuberculeuse

Votre prestataire de soins de santé a prescrit de la rifampine pour traiter votre infection tuberculeuse (tuberculosis, TB). Ce médicament doit être pris tous les jours pendant quatre mois. La rifampine peut vous empêcher de développer à l'avenir une tuberculose active, qui est une maladie plus grave.

Mon test de dépistage de la tuberculose est positif, mais ma radio thoracique est normale. Je ne me sens pas malade. Ai-je besoin de prendre de la rifampine ?

Oui. Même si vous ne vous sentez pas malade pour le moment, des germes de la tuberculose sont présents dans votre organisme. La prise de médicaments est le seul moyen de tuer les germes de la tuberculose présents dans votre organisme.

Quels sont les effets secondaires de la rifampine ?

La plupart des gens prennent ce médicament sans aucun problème. La rifampine peut occasionner un changement de couleur de votre urine (pipi), de votre salive, de vos larmes ou de votre transpiration, qui vireront alors au rouge-orangé. Ceci est normal. La couleur pourra s'atténuer au fil du temps.

Puis-je continuer à prendre mes autres médicaments, médicaments à base de plantes, vitamines ou compléments alimentaires ?

Cela dépend. Certains médicaments, vitamines et compléments alimentaires peuvent être pris en toute sécurité avec la rifampine. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Faites part à votre prestataire de soins de santé, infirmier(-ère) ou pharmacien(ne) des autres médicaments que vous prenez, dont les médicaments en vente libre, les médicaments sur ordonnance (y compris la contraception), les médicaments à base de plantes, les médicaments issus de la médecine traditionnelle, les vitamines et les compléments alimentaires.

Y a-t-il des aliments ou des boissons que je devrais éviter pendant la prise de rifampine ?

Oui. Ne buvez pas d'alcool pendant vos quatre mois de traitement. La combinaison d'alcool et de rifampine peut endommager votre foie. En l'état des connaissances actuelles, il n'y a aucun aliment qui devrait être évité pendant la prise de rifampine.

Que dois-je faire si j'oublie de prendre mon médicament ?

S'il s'agit toujours du même jour, prenez votre médicament tel que prescrit dès que vous vous en rappelez. Si vous avez manqué un jour, continuez à prendre votre médicament tel que prescrit. Si vous oubliez de prendre votre médicament, appelez votre prestataire pour lui demander la marche à suivre.



Arrêtez de prendre de la rifampine et appelez le cabinet de votre prestataire immédiatement si vous avez l'un ou plusieurs des effets secondaires suivants :

- Ne vouloir manger aucun aliment
- Nausées ou vomissements
- Maux de ventre
- Urine (pipi) marron (pas rouge ou orange)
- Selles (matières fécales/caca) de couleur claire
- Apparition de bleus ou de saignements facilement
- Éruption cutanée ou démangeaisons
- Jaunissement de la peau ou des yeux
- Grosse faiblesse ou fatigue
- Fièvre
- Maux de tête ou courbatures
- Vertiges

Si vous avez des effets secondaires néfastes, vous pouvez peut-être prendre un autre médicament pour traiter l'infection tuberculeuse. Si vous avez des inquiétudes, parlez-en à votre prestataire, infirmier(-ère) ou pharmacien(ne).

Questions courantes concernant la rifampine

Mon traitement contre l'infection tuberculeuse

Comment puis-je me rappeler de prendre mon médicament ?

Prenez votre médicament tous les jours à la même heure (par exemple, tous les jours avant le petit-déjeuner). Plusieurs moyens peuvent être employés pour éviter d'oublier votre médicament :

- ✓ Utilisez un journal de médicaments, comme le fascicule de suivi des médicaments contre l'infection tuberculeuse, afin de garder une trace de la manière dont vous prenez le médicament et du moment.
- ✓ Utilisez une application (appli) de calendrier sur votre téléphone portable ou ordinateur pour garder une trace de la manière dont vous prenez le médicament et du moment.
- ✓ Programmez une alarme pour prendre vos médicaments.
- ✓ Rangez vos médicaments toujours au même endroit, comme dans une table de nuit.
- ✓ Utilisez un pilulier hebdomadaire.
- ✓ Demandez à un ami ou un membre de la famille de vous rappeler de prendre vos médicaments.

Comment conserver la rifampine ?

Conservez votre rifampine à température ambiante. Ne rangez pas la rifampine là où il va faire très froid (comme au réfrigérateur), très chaud (comme près de votre cuisinière) ou très humide (comme dans l'armoire de votre salle de bain). Gardez-la hors de portée des enfants. Pour en savoir plus, consultez nyc.gov/health et recherchez « **medicine safety** » (sécurité des médicaments).

Ma prescription de rifampine peut-elle être fournie pour plus de 30 jours à la fois ?

Votre prestataire voudra sans doute vous voir tous les mois pendant la prise de rifampine pour s'assurer que le traitement est efficace et parler des éventuels effets secondaires. Ensemble, votre prestataire et vous pouvez décider ce qui fonctionnera le mieux.

Puis-je prendre moins de médicaments si je me sens en bonne santé ? Puis-je arrêter le traitement de manière précoce ?

Non. Il est important de prendre tous vos médicaments contre l'infection tuberculeuse jusqu'au bout pour vous donner la meilleure chance de tuer les germes de la tuberculose présents dans votre organisme. Si vous arrêtez le traitement de manière précoce, il se peut que vous tombiez malade plus tard. Parlez-en avec votre prestataire avant d'arrêter le traitement ou de prendre moins de médicaments.

Quand puis-je arrêter de prendre de la rifampine ?

Après avoir achevé vos quatre mois de traitement. Si vous avez du mal à prendre le médicament, parlez-en avec votre prestataire, afin qu'il ou elle puisse vous aider à aller jusqu'au bout du traitement.

Veillez parler à votre prestataire si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre traitement contre l'infection tuberculeuse. En cas d'urgence ou si les effets secondaires s'aggravent, contactez votre prestataire ou rendez-vous aux urgences les plus proches.

Coordonnées du prestataire/ de la clinique

Nom du prestataire/de la clinique :

Numéro de téléphone :

Adresse :
