

Domande comuni sulla rifampicina

La mia terapia per l'infezione tubercolare

Il tuo operatore sanitario ti ha prescritto la rifampicina come terapia per l'infezione tubercolare (tuberculosis, TB). Tale farmaco deve essere preso ogni giorno per quattro mesi. La rifampicina può contribuire a prevenire l'attivarsi della malattia della tubercolosi in futuro, con conseguenze più gravi.

Il test della tubercolosi è positivo ma la radiografia del torace è normale. Non mi sento male. Devo iniziare a prendere la rifampicina?

Sì. Anche se al momento ti senti bene, comunque nel tuo organismo sono presenti i batteri della tubercolosi. L'unico modo per debellare i batteri della tubercolosi nel tuo organismo è tramite l'assunzione dei farmaci.

Quali sono gli effetti collaterali della rifampicina?

La maggior parte delle persone può prendere tale farmaco senza riportare alcun problema. Il farmaco rifampicina potrebbe colorare di arancione/rosso le urine (la pipì), la saliva, le lacrime o il sudore. È normale. Il colore andrà via con il tempo.

Posso continuare a prendere gli altri farmaci, anche a base di erbe, le vitamine e gli integratori?

Dipende. Alcuni farmaci, vitamine e integratori si possono prendere in sicurezza durante l'assunzione della rifampicina. Altri invece non sono altrettanto sicuri. Parla con il tuo operatore sanitario, infermiere o farmacista degli altri farmaci che assumi, compresi i farmaci da banco, quelli con prescrizione medica (anche la pillola anticoncezionale), i farmaci a base di erbe, i farmaci tradizionali, le vitamine e gli integratori.

Esistono cibi o bevande da evitare mentre prendo la rifampicina?

Sì. Non bere alcol durante i quattro mesi di terapia. Assumere alcol insieme alla rifampicina può danneggiare il fegato. Non sono noti cibi da evitare durante la terapia a base di rifampicina.

Cosa devo fare se dimentico di prendere i farmaci?

Se è ancora lo stesso giorno, prendi il medicinale secondo le istruzioni, appena lo ricordi. Se hai saltato un giorno, continua a prendere il medicinale secondo le istruzioni. Se hai dimenticato di prendere il medicinale chiama il tuo operatore sanitario per ricevere indicazioni.



Interrompi l'assunzione di rifampicina e chiama subito il tuo operatore sanitario se manifesti uno dei seguenti effetti collaterali:

- Disappetenza verso qualsiasi cibo
- Nausea o vomito
- Dolori allo stomaco
- Urine (pipì) scure (non rosse o arancioni)
- Feci di colore chiaro (feci/cacca)
- Lividi o sanguinamento facili
- Eruzioni cutanee o prurito
- Pelle o occhi ingialliti
- Debolezza o stanchezza eccessiva
- Febbre
- Mal di testa o dolori muscolari
- Vertigini

Se riporti effetti indesiderati, potresti prendere un farmaco diverso come terapia per l'infezione tubercolare. In caso di dubbi, parla con il tuo operatore sanitario, infermiere o farmacista.

Domande comuni sulla rifampicina

La mia terapia per l'infezione tubercolare

Come faccio a ricordarmi di prendere il medicinale?

Prendi il medicinale nello stesso momento ogni giorno (per esempio, ogni giorno prima di colazione). Esistono diversi modi per monitorare l'assunzione dei farmaci:

- ✔ Usa una tabella per la terapia farmacologica, come il diario dei farmaci per la tubercolosi, per registrare come e quando assumi i farmaci.
- ✔ Usa una applicazione (app) per avere un calendario sul tuo cellulare o computer e monitorare come e quando assumi i farmaci.
- ✔ Imposta una sveglia quotidiana per prendere i farmaci.
- ✔ Tieni i medicinali sempre nello stesso posto, come su un comodino vicino al letto.
- ✔ Usa un portapillole diviso per i giorni della settimana.
- ✔ Chiedi a un amico o a un familiare di ricordarti di prendere i medicinali.

Come devo conservare la rifampicina?

Conserva il medicinale a temperatura ambiente. Non mettere il medicinale in un luogo che diventa troppo freddo (come il frigorifero), molto caldo (come vicino ai fornelli) o molto umido (come nel mobiletto del bagno). Tienilo lontano dai bambini. Per ulteriori informazioni, visita il sito nyc.gov/health e cerca "medicine safety" (sicurezza farmaceutica).

È possibile prescrivere rifampicina per più di 30 giorni alla volta?

Molto probabilmente il tuo operatore sanitario vorrà visitarti ogni mese mentre assumi la rifampicina, per accertarsi che la terapia funziona e discutere degli effetti indesiderati. Insieme al tuo operatore sanitario puoi decidere cosa sia meglio per te.

Posso diminuire la dose di farmaci se mi sento bene? Posso terminare prima la terapia?

No. È importante finire di prendere tutti i farmaci per la tubercolosi per assicurarti la possibilità di eliminare dal tuo organismo i batteri che causano la tubercolosi. Se interrompi la terapia in anticipo, potresti comunque ammalarti in seguito. Parla con il tuo operatore sanitario prima di interrompere la terapia o diminuire la quantità di farmaci.

Quando posso smettere di assumere la rifampicina?

Dopo che hai completato i quattro mesi di terapia. Per problemi con l'assunzione dei farmaci, parla con il tuo operatore sanitario che ti aiuterà a completare la terapia.

Per eventuali domande o dubbi riguardanti la terapia per l'infezione tubercolare ti invitiamo a rivolgerti al tuo operatore sanitario. Per emergenze o se gli effetti indesiderati peggiorano, contatta il tuo operatore sanitario o recati al più vicino pronto soccorso.

Informazioni di contatto dell'operatore sanitario/ambulatorio

Nome dell'operatore/ambulatorio

Numero telefonico:

Indirizzo:
