

گھریلو تشدد سے متعلق صدمہ زدہ دماغی ضرر کو سمجھنا

معلومات اور وسائل



Mayor's Office to
End Domestic and
Gender-Based Violence

NYC FAMILY JUSTICE CENTERS

(718) 508-1220 198 East 161st Street, 2nd Fl.	BRONX
(718) 250-5113 350 Jay Street, 14th Fl.	BROOKLYN
(212) 602-2800 80 Centre Street, 5th Fl.	MANHATTAN
(718) 575-4545 126-02 82nd Avenue	QUEENS
(718) 697-4300 126 Stuyvesant Place	STATEN ISLAND

ایمرجنسی میں 911 پر کال کریں یا ٹیکسٹ کریں۔

سوسائٹیڈ اور کرائسس لائف لائن (Suicide and Crisis Lifeline) کو 988 پر کال کریں یا آن لائن
988lifeline.org/chat پر چیٹ کریں

کنگز کیئرز (Kings CARES) سے
1-929-310-1218

پر KingsCareReferrals@nychhc.org

رابطہ کریں ذاتی نوعیت کے صنف پر مبنی تشدد
اور گلا دبانے سے متعلق فالو اپ طبی نگہداشت،
بشمول حفاظتی یا قانونی مقاصد کے لیے ضرر کو
ضبط تحریر کرنے اور لوگوں کو خصوصی طبی
اور قانونی امداد سے مربوط کرنے کے لیے۔ سبھی
متاثرین کے لیے، ان کے جائے قیام، بیمہ، ترک
وطن کی حالت، یا صنفی شناخت سے قطع نظر،
جمعہ کو صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک
کھلا رہتا ہے۔

وسائل

اگر آپ کا گلا دبایا گیا ہے، سر پر چوٹ کا سامنا ہوا ہے،
سوچتے ہیں کہ آپ کو ان علامات میں سے کسی کا سامنا
ہو رہا ہے یا آپ کو یقین نہیں ہے تو، آپ مدد حاصل کر
سکتے ہیں۔

NYC کی 24 گھنٹے چلنے والی ہوپ ہاٹ لائن
(Hope Hotline)
1-800-621-HOPE (4673)
866-604-5350 :TTY

گھریلو اور صنف پر مبنی تشدد کے مدنظر
معلومات اور وسائل کے لیے NYC HOPE
ریسورس ڈائریکٹری (NYC HOPE Resource)
پر www.nyc.gov/NYCHOPE (Directory)
ملاحظہ کریں

جڑنے کے لیے جس بورو میں آپ رہتے ہیں (یا
جہاں آپ محفوظ ترین محسوس کریں) وہاں NYC
فیملی جسٹس سنٹر (NYC Family Justice
Center, FJC) میں تشریف لائیں۔ سارے سینٹرز
بذات خود یا فاصلاتی خدمات کے لیے، پیر تا
جمعہ، 9 بجے صبح سے 5 بجے شام تک کھلے
رہتے ہیں۔ کوئی اپائنٹمنٹ ضروری نہیں ہے۔ FJCs
تمام تر عمر، جنسی رجحان، اور صنفی شناخت
والے لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، چاہے ترک
وطن کی حیثیت، آمدنی یا بولی جانے والی زبان جو
بھی ہو

طبی توجہ یا علاج حاصل نہیں کرنے کے امکانی خطرات

اگر آپ کا حال ہی میں گلا دبایا گیا ہے، سر پر چوٹ کا سامنا ہوا ہے یا آپ میں زیادہ خطرے والی کوئی علامات ہیں تو، طبی نگہداشت میں تاخیر کرنا مستقل معذوری یا انتہائی صورتوں میں موت کا بھی باعث بن سکتا ہے۔

طبی قدر پیمائی کروانے کے لیے آپ کو فوری طور پر قریب ترین ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیے اگر:

- آپ کا حال ہی میں گلا دبایا گیا ہے، سر پر چوٹ کا سامنا ہوا ہے یا آپ میں زیادہ خطرے والی کوئی علامات ہیں
- وقوع یا مکرر واقعات کے بعد ہفتوں یا مہینوں میں آپ میں زیادہ خطرے والی کوئی علامات پیدا ہوتی ہیں یا آپ کی علامات بگڑ جاتی ہیں۔

مکرر TBIs زیادہ خطرے والی علامات اور طویل مدتی اثرات کا سامنا ہونے کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔

اگر آپ کو متعدد واقعات کا سامنا ہوا ہے یا وقوعہ کچھ وقت پہلے پیش آیا تھا اور آپ کو فکر ہے کہ اس کی وجہ سے آپ میں کچھ علامات یا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں تو، ابتدائی نگہداشت کے معالج سے طبی قدر پیمائی کروائیں

اگر آپ کا کوئی ڈاکٹر ہے تو، + NYC Health [nyc.gov/hospitals](https://www.nyc.gov/hospitals) کسی سے رابطہ کروانے کے لیے آپ لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔

- مٹانے یا آنت پر کنٹرول زائل ہونا چنانچہ آپ خود کو گیلا یا گندہ کر لیتے ہیں
- سانس لینے میں پریشانی
- غشی کے دورے، جو بے چینی، لڑاکا پن، جارحیت، یا لرزش کے بطور ظاہر ہو سکتی ہے
- فالج، جو چہرے کی کمزوری (سنّ پن، کم احساس)، بازو میں کمزوری، بولنے میں دشواری یا چلنے میں دشواری یا ناقص باہمی ربط کے بطور ظاہر ہو سکتی ہے۔

اگر آپ کو گلا دبائے جانے کا امنا ہوا ہے اور اضافی نشانیوں، علامات، حفاظتی تشویشات، اور وسائل کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو، NYC [HOPE: \[nyc.gov/content/nycchope/pages/understanding-strangulation\]\(https://www.nyc.gov/content/nycchope/pages/understanding-strangulation\)](https://www.nyc.gov/content/nycchope/pages/understanding-strangulation) ملاحظہ کریں۔

Ⓛ طویل مدتی اثرات:

- افسردگی، اضطراب یا PTSD
- یادداشت یا فکری مسائل
- شخصیت میں تبدیلیاں
- ڈیمنشیا یا الزائمر کے مرض کا زیادہ خطرہ

گھریلو تشدد سے متعلق صدمہ زدہ دماغی ضرر کیا ہے؟

صدمہ زدہ دماغی ضرر (traumatic brain injury, TBI) تب پیش آتا ہے جب واحد وقوعہ یا مکرر واقعات کے دوران سر یا گردن میں ضرب لگنے کے سبب دماغ کو نقصان پہنچتا ہے، یا اس وجہ سے کہ دماغ کو کافی آکسیجن نہیں ملتا ہے۔ گھریلو تشدد سے متعلق TBI ایک دماغی ضرر ہے جو قریبی پارٹنر یا فیملی کے رشتے میں تشدد کے نتیجے میں پیش آتا ہے۔

DV سے متعلق TBIs کی عمومی وجوہات میں شامل ہیں -

- گلا دبنے یا حبس دم کے ذریعے دماغ میں آکسیجن کی روانی کی کمی
- سر کو براہ راست ضرب یا نفوذ کرنے والے ضرر کی وجہ سے سر کو طبعی صدمہ
- گردن میں زخم

DV سے متعلق TBI کی زیادہ خطرے والی علامات اور طویل مدتی اثرات

علامات واقعہ پیش آنے کے بعد فوری طور پر، دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں نظر آ سکتی ہیں۔

! زیادہ خطرے کی علامات:

- ہوش و حواس زائل ہونا جیسے یادداشت میں خلاء، چڑچڑاہٹ، یا بلیک آؤٹ
- غنودگی یا سر درد
- توجہ مرکوز کرنے میں پریشانی، اشتباہ، بے سمتی
- دوہری بینائی یا بینائی زائل ہونا
- سماعت زائل ہونا یا کانوں میں گھنٹیاں بجنا