

איבערבליק

אָפֿיאָוידס:

- רעכענען איין פרעסקריפשאַן פעינקילערס און העראָאין
- קען גורם זיין דעם מענטש'ס אטעם זיך צו פארלאנגזאמען און אפילו אויפהערן, וואס איז באקאנט אלס אן איבערדאזע

Naloxone:

- איז אַ זיכערער מעדיצין וואָס קען צוריקדרייען אַן אָפֿיאָויד איבערדאָזע
- האָט נישט קיין ווירקונג אויף אַלקאָהאָל אָדער אַנדערע דראַגס
- נעמט צוויי ביז פינף מינוט אנצוהויבן צו ארבעטן און אירע ווירקונגען האלטן אן 30 ביז 90 מינוט.
- קען פאַרלאַנגען מער ווי איין דאָזע
- קען צוברענגען צוריקציונג-סימפטאָמען (צ.ב.ש. טרייסלונגען, איבלונג, ברעכן, אומרואיגקייט, מוסקל ווייטאָגן) ביז די naloxone וועפט אויס

ביישפילן פון פרעסקריפשאַן פעינקילערס	
דזשענעריק	ברענד נעים
Hydrocodone	Vicodin®, Lorcet®, Lortab®, Norco®, Zohydro®
Oxycodone	Percocet®, OxyContin®, Roxicodone®, Percodan®
Morphine	MS Contin®, Kadian®, Embeda®, Avinza®
Codeine	Tylenol® with Codeine (Tylenol® #3, Tylenol® #4)
Fentanyl	Duragesic®
Hydromorphone	Dilaudid®
Oxymorphone	Opana®
Meperidine	Demerol®
Methadone	Dolophine®, Methadose®
Buprenorphine	Suboxone®, Subutex®, Zubsolv®, Bunavail®, Butrans®

העראָאין איז אויך אַן אָפֿיאָויד

אלע אָפֿיאָוידס שטעלן מענטשן אין געפאַר פון אַן איבערדאָזע.

פאַרמיידט אָפֿיאָויד איבערדאָזע

- זייט פאַרזיכטיג אויב איר שטעלט אַפ אָדער פאַרפאַסט אַ דאָזע. דאס קען נידערן אייער טאלעראַנץ, דאס מיינט וויפיל פון א מעדיצין אייער קערפער קען פארנעמען.
- פאַרמיידט אויסצומישן אָפֿיאָוידס מיט אַנדערע מעדיציניען אָדער דראַגס, ספעציעל benzodiazepines (Xanax®, Valium®), אַלקאָהאָל אָדער קאָקעיין.
- פאַרמיידט פון נעמען אָפֿיאָוידס ווען איר זענט אַליין. עס איז וויכטיג צו האבן איינעם נעבן זיך אויב עס איז דא אן עמערדזשענסי.
- זייט פארזיכטיג אויב איר נעמט מער אפֿיאָוידס ווי געווענליך. איר קענט קיינמאָל נישט וויסן וויאָזוי אייער קערפער וועט רעאַגירן.

וויכטיג: לאַזט אַנדערע וויסן וואו אייער naloxone ליגט און וויאָזוי עס צו נוצן.

הילפסמיטלען

- ווערט געוואר וועגן **לאקאלע פראגראמען** וואס שטעלן צו טרענירונג און naloxone פריי פון אפצאל : באזוכט health.ny.gov/overdose
- ווערט געוואר וועגן **באהאנדלונג אויסוואלן**: רופט די OASAS HOPEline אויף (877-846-7369) 877-8-HOPENY, טעקסט HOPENY צו 467369 אדער באזוכט oasas.ny.gov/accesshelp
- ווערט געוואר וועגן **איבערדאזע פארמיידונג**: זוכט "Prevent Overdose" (פארמיידט איבערדאזע) ביי nyc.gov/health

וויאָזוי צו נוצן Naloxone



איבערדאָזע רעאַקציע שריט

1. רופט 911

פאלגט אויס דעם דיספעטשער'ס אנווייזונגען.

2. גיט naloxone אויב איר האט עס


אויב עס איז נישטא קיין רעאַקציע אין דריי מינוט, גיבט א צווייטע דאזע. בלייבט מיטן מענטש. אויב יענער וועקט זיך אויף, אנטמוטיגט זיי פון נעמען מער אפיאוידס.

אויב איר ווייסט נישט וואס דער מענטש האט גענומען, זאלט איר יענעם נאך אלס געבן naloxone.

מולטי-שריט אינטראנעזעל Naloxone


1

נעמט אַראָפּ די געלע קעפלעך




2

שרויפט אַרויף דעם ווייסן קאָון




3

נעמט אַראָפּ דעם פּוירפל קעפל פונעם naloxone פלעשל



4

שרויפט איידל אַריין דאָס naloxone פלעשל אינעם פעסל פונעם סירינדזש



5

בייגט דעם קאָפּ אויף צוריק; לייגט אַריין דעם ווייסן קאָון אינעם נאָזלאַך; גיט אַ קורצן, שטאַרקן שטופּ אויף דער ענדע פונעם פלעשל כדי אַריינצושפּריצן naloxone אינעם נאָז;



אַ האַלבן פלעשל אין יעדן נאָזלאַך

6

אויב איז נישטאָ קיין רעאַקציע אין דריי מינוט, גיט אַ צווייטע דאָזע

אויטאָמאטישער-איינשפריצער Naloxone

די naloxone אויטאָמאטישער-איינשפריצער האָט רעדנדיגע אָנווייזונגען וויאָזוי איינצושפּריצן naloxone אינעם אויבערשטן דיכט, דורך קליידונג, אויב נויטיג. עס איז אויך דאָ אַ טרענירונג-געצייג בייגעלייגט מיט יעדן פעקל, כדי דאָס צו קענען פּראַקטיצירן.

3. אויב דער מענטש אָטעמט נישט, טוט אָטעמען-רעטונג אָדער CPR, אויב איר ווייסט וויאָזוי

4. אויב יענער רעאַגירט נאך אלס נישט, לייגט דעם מענטש אויפן זייט צו פאַרמיידן פון זיך דערשטיקן. בלייבט מיטן מענטש ביז הילף קומט אָן.

באַמערקונג: די ניו יאָרק סטעיט 911 גוד-סעמעריטען געזעץ שטעלט צו באַדייטנדע באַשיצונג פאַר יעדן וואָס רופט 911 צו ראַטעווען אַ לעבן, אפילו אויב מען טרעפט דאָרט דראַגס.

איינצלע שריט אינטראנעזעל Naloxone




דער נאז שפּריץ דארף נישט נאזל ווערן צוזאמגעשטעלט און קען ווערן אריינגעשפּריצט אין איין נאזלאך דורכן שטופן דעם פלאנדזשער. פרובירט נישט אויס דעם געצייג - יעדע געצייג קען נאר ווערן גענוצט איין מאל.

מולטי-שריט אינטראמוסקיולער Naloxone



1 נעמט אַראָפּ די דעקלעך פונעם naloxone פלעשל און נאָדל



2 לייגט אַריין דעם נידל דורכן גומינעם שטאַפּער מיט פלעשל איבערגעדרייט; שלעפט צוריק אויפן פלאנדזשער, ארייננעמענדיג דעם גאַנצן אינהאַלט

3 שפּריצט איין דאָס גאַנצע פלעשל אינעם אויבערשטן אַרעם אָדער דיכט-מוסקל

4 אויב איז נישטאָ קיין רעאַקציע אין דריי מינוט, גיט אַ צווייטע דאָזע

ווען צו נעמען אַ ריפּיל

- איין אדער מער דאזעס ווערן גענוצט
- Naloxone ווערט פאַרלוירן אָדער געשעדיגט
- Naloxone לויפט אָפּ אָדער דערנענטערט זיך צום אָפּלויף-דאָטום

ביים פאַרלאַנגען אַ ריפּיל, זאָגט פאַר אייער אָפּטייקער אויב די Naloxone איז גענוצט געוואָרן. האַלט Naloxone אין שטוב-טעמפּעראַטור, אַוועק פון דירעקטע ליכטיגקייט.

אָטעמען רעטונג

- בייגט דעם מענטש'ס קאָפּ אויף צוריק
- פאַרמאַכט זיין אדער איר נאָז
- גיבט אַריין צוויי שנעלע אטעמס אינעם מויל
- גייט ווייטער מיט איין אָטעם יעדע פינף סעקונדעס ביז דער מענטש הויבט אָן אָטעמען

סימנים פון איבערדאָזע

- מענטש רעאַגירט נישט פּרובירט אויפצואוועקן דעם מענטש דורך קרעפטיג רייבן מיט אייער פינגער-קנעכלען אַרויף און אַראָפּ דעם פאַרנט פון זיין אדער איר ריפּן-ביין.
- אָטעם פאַרלאַנגזאַמט זיך אָדער שטעלט זיך אָפּ
- ליפּן און/אָדער פינגער-נעגל ווערן בלו, בלאַס אָדער גרוי