

זיך אפגעבן מיט א וואונד

אנווייזונגען וויאזוי
זיך אליין צו אפגעבן
מיט א וואונד פאר
מענטשן וואס באנוצן
זיך מיט דראָגס



1 וואשט אייערע הענט מיט
זייף און וואסער אדער טוט
אן הענטשוק.



2 רייניגט די וואונד מיט זייף און
וואסער און טרוקנט עס גוט אפ.
נוצט נישט אלקאהאל אדער האנט
סאניטייזער צו רייניגן א וואונד.



3 לייגט ארויף אן אנטיביאטיק
קרעם אויף די אויבערפלאך
פון די וואונד.



4 באדעקט די וואונד מיט א
סטערילע גאָז פּעד און
פארזיכערט עס מיט א באנדאזש.



6 טוישט די גאָז פּעד אדער
מעדיצינישע באנדאזש צוויי
מאל א טאג.



ווען זיך צו ווענדן פאר מעדיצינישע קעיר

אויב סיי וועלכע פון די פאלגנדע זאכן געשעהען צו אייך, קען זיין אז די וואונד איז ערנסט און אז איר דארפט א מעדיצינישע אונטערזוכונג. צו טרעפן א דאקטאר, רופט 311 אדער 844-692-4692. פאר שטיצע פאר מענטשן וואס באנוצן זיך מיט דראַגס, אריינרעכענענדיג שאדן רעדוקציע און מעדיצינישע סערוויסעס, באזוכט nyc.gov/alcoholanddrugs.



עפעס שטעקט אינעווייניג אין די וואונד, ווי צום ביישפיל א נאדל שפיץ.




די וואונד איז איבער אן אדער אדער אויף די פנים, האלז, הענט, פיס אדער ברוסטקאסטן.



א רויטליכקייט פארשפרייט זיך, רויטע ליניעס ארום די עקן פון די וואונד אדער א טונקלערע קאליר ארום די וואונד.



די וואונד ווערט גרעסער, טיפער, מער ווייטאגליך אדער מער עמפפינדליך.



איר באקומט פיבער אדער טשילס, א קורצע אטעם, שוואכקייט, מוסקלען ווייטאג און פילן אויסגעמוטשעט.



מער פליסיגקייטן רינען ארויס אדער עס איז דא א געדיכטע געלע-גרינע פליסיגקייט (פאַס) אדער די וואונד שמעקט.

