

Cómo analizar sus drogas con tiras reactivas de xilacina

La xilacina, comúnmente conocida como "tranq", es un tranquilizante para animales que se ha encontrado en el suministro de drogas de la ciudad de Nueva York. La xilacina puede provocar una sedación extrema, lo que aumenta el riesgo de sobredosis, y heridas graves en la piel. Las tiras reactivas pueden ayudarle a determinar si las drogas que piensa utilizar contienen xilacina.

¿Cómo puedo comprobar si mis drogas contienen xilacina?

1. Ponga unos 10 miligramos (mg) de sus drogas (lo suficiente para cubrir el pelo de Abraham Lincoln en un centavo) en un recipiente limpio y seco (como un vaso medidor de medicamentos) o en un microvaso de plástico (si dispone de uno).
 - Si no puede probar 10 mg de sus drogas, ponga al menos unos granos en un recipiente limpio y seco.
2. Agregue 5 mililitros (1 cucharadita) de agua a sus drogas y revuélvalos.
3. Coloque la tira reactiva con la parte ondulada hacia abajo en el agua. Deje que la tira absorba el agua durante 15 segundos.
4. Saque la tira reactiva del agua y colóquela sobre una superficie plana durante cinco minutos antes de leer los resultados. Asegúrese de leer los resultados en los 10 minutos siguientes a sacar la tira del agua.

Si también dispone de tiras reactivas para fentanilo, puede analizar sus medicamentos para fentanilo y xilacina utilizando la misma muestra.

¿Qué significan los resultados de la prueba?

Una línea es una **prueba positiva**, lo que significa que se ha detectado xilacina en sus drogas. Consulte la sección "¿Qué debo hacer si obtengo un resultado positivo o creo que mis drogas contienen xilacina?" para obtener orientación.



Dos líneas (incluso si la segunda línea es poco visible) es una prueba negativa, lo que significa que no se ha detectado xilacina en sus drogas. Sin embargo, ninguna prueba es precisa al 100%, por lo que sus drogas pueden seguir conteniendo xilacina.



La ausencia de líneas o una línea más cercana al lado ondulado de la tira es una prueba **inválida**. Vuelva a realizar la prueba con una tira nueva, si dispone de una.



Recuerde que ninguna prueba es exacta al 100%. Ciertas condiciones pueden aumentar sus posibilidades de obtener un falso positivo (por ejemplo, que ciertas sustancias, como la lidocaína, estén presentes en sus drogas) o un falso negativo (por ejemplo, que la muestra analizada no contenga xilacina, pero que ésta esté presente en el resto de sus drogas).

¿Qué debo hacer si obtengo un resultado positivo o creo que mis drogas contienen xilacina?

- Considere la posibilidad de no consumir las drogas, especialmente si está solo o en un lugar donde pueda ser peligroso estar inconsciente durante mucho tiempo.
- Llévelos a un centro de prevención de sobredosis para utilizarlos bajo supervisión.
- Si tiene heridas en la piel, seguir utilizando xilacina puede empeorarlas. Si tiene heridas que no mejoran o desaparecen, hable con su proveedor de atención de salud. Si necesita ayuda para encontrar un proveedor, llame al **311** o al 844-692-4692.

¿Dónde puedo conseguir tiras reactivas de xilacina?

Puede solicitar tiras reactivas de xilacina para uso personal en línea a los fabricantes, incluida la red MATTERS Network en mattersnetwork.org/request-test-strips.

¿Qué puedo hacer para reducir mi riesgo de sobredosis de opioides?

La xilacina no es un opioide. Sin embargo, en la ciudad de Nueva York, la xilacina sólo se ha encontrado con drogas que también contienen fentanilo (un opioide muy fuerte). Si consume drogas que contienen xilacina, tome medidas para reducir el riesgo de sobredosis de opioides:

- Evite consumir drogas solo. Consuma drogas con otras personas y túrnense para consumirlas.
 - Si va a consumir solo, llame a la línea directa Never Use Alone (Nunca consuma solo) al 800-484-3731 antes de consumir.
- Antes de consumir drogas, pídale a alguien de confianza que le controle regularmente.
- Vaya lentamente tomando pequeñas cantidades.
- Evite mezclar drogas.
- Consiga naloxona, un medicamento seguro y fácil de usar que puede revertir los efectos de una sobredosis de opioides (incluso si la persona permanece sedada debido a la xilacina). Llame al 311 para averiguar dónde conseguir naloxona sin costo alguno.

Para obtener más información, incluidos los servicios de tratamiento, reducción de daños y comprobación de drogas, visite a nyc.gov/alcoholanddrugs. Si tiene alguna pregunta sobre las pruebas de detección de drogas, envíe un correo electrónico a drugchecking@health.nyc.gov.