



배우기:

**담당 의료 서비스 제공자와
전립선암 스크리닝에 대해
상의하십시오.**

전립선암은 뉴욕시의 남성 중 2번째로 제일 흔한 유형의 암입니다.

전립선은 정액 생성을 돕는 남성의 작은 분비선입니다. 전립선암은 조기에 발견 시 치료 반응이 가장 좋습니다.

폐암 외에 다른 어떤 유형의 암보다 더 많은 남성들이 전립선암으로 사망합니다. 전립선암 스크리닝을 받고 조기에 발견하면 귀하의 목숨을 구할 수 있습니다.

전립선암의 스크리닝 검사는 무엇입니까?

스크리닝을 받기로 정하신 경우, 전립선 특이 항원 (prostate-specific antigen, PSA) 혈액 검사를 받아야 합니다. 흔하지는 않지만 의료 서비스 제공자가 다른 검사를 권장할 수도 있습니다. PSA 수치가 정상보다 높은 경우, 의료 제공자가 조직 검사를 권장할 수 있습니다.



어떤 징후와 증상이 있습니까?

전립선암이 있는 경우, 증상이 없을 수도 있습니다. 증상이 있는 경우, 다음을 포함할 수 있습니다.

- 소변 시작 문제
- 빈번한 소변
- 완전히 방광을 비울 수 없는 문제
- 소변 도중 통증 또는 화끈함
- 소변 흐름이 약하거나 끊김
- 고통스러운 사정
- 소변 또는 정액에 혈흔
- 없어지지 않는 등, 고관절 또는 골반의 통증

위험 요인은 무엇입니까?

전립선암의 위험은 나이가 들수록 높아집니다. 다음에 해당하는 경우 전립선암 위험이 높을 수 있습니다.

- 흑인 또는 아프리카계 미국인
- 가족 병력 중에 전립선암이 있는 경우
- 가족 병력 중에 특정한 기타 암이 있는 경우

의료 제공자와 가족의 암 병력에 대해 상의하십시오.

스크리닝과 치료의 혜택과 위험은 무엇인가요?

스크리닝의 혜택은 조기에 전립선암을 감지하는 것이며, 이는 귀하의 목숨을 구할 수 있습니다.

일부 사람들의 경우 전립선암이 전이하지 않으며 또는 증상을 유발하지 않거나 생명을 위협하지 않을 수 있습니다. 전립선암 치료에는 위험이 따릅니다. 저위험도의 종양인 경우, 의료 제공자와 관찰 또는 치료 계획에 대해 상의할 수 있습니다.

흑인 남성은 전립선암이 걸릴 위험과 사망 위험이 제일 높습니다. 스크리닝에 대해 의료 제공자와 꼭 상의하십시오.

누가 스크리닝을 받아야 합니까?

귀하에게 적합한지 확인하기 위해 스크리닝에 대해 의료 제공자와 상담하십시오. 남성은 다음 나이에 스크리닝 시작에 대해 의료 제공자와 상의해야 합니다.

- 65세 이전에 전립선암에 걸린 가까운 가족이 한 명을 초과하는 경우, 40세
- 흑인이거나 65세 이전에 전립선암에 걸린 가까운 가족이 한 명인 경우, 45세
- 특정한 위험 요인이 있는 경우 50세

스크리닝과 관리는 얼마가 드나요?

대부분의 건강 보험 업체는 PSA 스크리닝을 보험 급여합니다. 보험이 없으신 경우 **311**번에 전화하십시오.

무보험이시며 전립선암 치료가 필요하신 경우, Medicaid Cancer Treatment Program(메디케이드 암 치료 프로그램)의 도움을 받을 수도 있습니다. 더 자세한 정보는 866-442-2262번으로 전화하십시오.





자세한 정보는
nyc.gov/health를 방문하여
"prostate cancer" (전립선암)
을 검색하십시오.