

באשיצט אייך אנטקעגן פאליא

פאליאמייעלייטיס, אדער פאליא, איז א ווייראל אינפעקציע פאראורזאכט דורך די פאליאווירוס, א מין פון ענטעראווירוס. די קראנקהייט איז אידענטיפיצירט דורך פאראליזירונג אדער שוואכקייט אין ארעמס, פיס אדער ביידע. עס זענען נישט געווען קיין פעלער פון ווילדע פאליאווירוס אין די U.S. זינט 1979.

די מערסט וויכטיגסטע וועג פאר קינדער און ערוואקסענע זיך צו באשיצן פון פאליא איז צו ווערן וואקסנירט גלייך אויב זיי האבן נישט באקומען אלע רעקאמענדירטע פאליא וואקסין דאזעס. קינדער זאלן באקומען פיר דאזעס פון פאליאווירוס וואקסין אנגעהויבן פון 2 מאנאטן. מענטשן וואס טוען אנהויבן די וואקסין סעריע נאך די עלטער פון 4 זאלן באקומען א סך הכל פון דריי דאזעס.

ערוואקסענע וואס זענען געווען אינגאנצן וואקסנירט אלץ קינדער און וואס זענען אין א ריזיקע פון ווערן אויסגעשטעלט צו פאליאווירוס יעצט זאלן באקומען איין ערוואקסענע בוסטער דאזע וואקסין.

וואס איר דארפט וויסן וועגן פאליא

ווער באקומט פאליא?

אן אומוואקסנירטע פערזאן — קינד אדער ערוואקסענע — קען באקומען פאליא ביי סיי וועלכע עלטער.

וויאזוי ווערט פאליא פארשפרייט?

פאליאווירוס איז מערסטנס מאל פארשפרייט צו מענטשן וואס זענען נישט פולקאם וואקסנירט אנטקעגן פאליא דורך פיס (פופ) פון אן אינפעקטירטע מענטש אויף די הענט אדער אביעקטן. אפט וואשן די הענט, ספעציעל נאכ'ן נוצן די טוילעט און נאכ'ן טוישן ווינדלען, איז זייער וויכטיג. עס איז אויך מעגליך צו פארשפרייטן די פאליאווירוס דורך שפייאכץ און רעספעראטארי טראפן. פאליאווירוס איז גרינג פארשפרייט אין אומוואקסנירטע הויזגעזונט.

וואס זענען די סימפטאמען פון פאליא?

מערסטנס מענטשן אינפעקטירט מיט די פאליאווירוס טוען נישט האבן קיין סימפטאמען, כאטש זיי קענען נאך אלץ זיין אנשטעקיג. איין אין פיר מענטשן אינפעקטירט מיט פאליאווירוס אינפעקציע וועלן האבן פלו-סארט סימפטאמען, אזוי ווי האלז ווייטאג, פיבער, מידקייט, איבלען און בויך ווייטאג. בערך פיר אין 100 (4%) מענטשן מיט פאליאווירוס אינפעקציע האבן מענינזשייטוס, אן אינפעקציע פון די פליסיגקייט און מעמברעינס פון די מח און שדרה. בערך איין אין 200 (0.5%) מענטשן מיט פאליאווירוס אינפעקציע האבן פאראליזירונג.

ווי שנעל נאך די אינפעקציע טוען סימפטאמען ערשיינען?

מענטשן וואס זענען אויסגעשטעלט צו די פאליאווירוס קענען אנטוויקלען אינפעקציע דריי ביז זעקס טעג נאכ'ן אויסשטעלונג, פאראליזירונג וואלט פאסירט צווישן זיבן און 21 טעג נאכ'ן זיין אויסגעשטעלט.

ווען און פאר ווי לאנג קען א מענטש פארשפרייטן פאליא?

די פאליאווירוס איז זייער אנשטעקיג. פאציענטן מיט פאליאווירוס אינפעקציע קענען פארשפרייטן די וויירוס איידער און ביז צו צוויי וואכן נאך זיי האבן ערשט געהאט סימפטאמען. אבער, פאציענטן קענען פארשפרייטן די קראנקהייט ווילאנג די וויירוס איז אין זייער פיס אדער שפייאכץ. פאליאווירוס קען זיך פארשפרייטן פון מענטשן אפילו זיי האבן נישט סיי וועלכע סימפטאמען.

וועלכע וואקסינען זענען אוועילעבל פאר פאליא?

עס זענען דא צוויי מינים פון פאליא וואקסין: א לעבעדיגע אפגעשוואכטע וויירוס מויל וואקסין און א נישט אקטיווע וויירוס איינשפריצן וואקסין. זינט 2000, איז בלויז די נישט אקטיווע וויירוס איינשפריצן וואקסין געווארן אוועילעבל אין די U.S., כאטש די לעבעדיגע אפגעשוואכטע מויל וואקסין קען נאך ווערן גענוצט אין אנדערע לענדער.

די איינשפריצן וואקסין ווערט געגעבן דורך אן איינשפריץ אין די פיס אדער ארעם און קען נישט פאראורזאכן פאראליזירנג. די וואקסין איז פארזיכערט, איז זייער ווירקזאם און קען אייך נישט געבן פאליא. זייטיגע ווירקונג פון די איינשפריץ זענען מילד, אריינגערעכנט ארעם און פיס ווייטאג דארט ווי די איינשפריץ איז געגעבן געווארן.

וואס איז א וואקסין-באקומענע פאליאוויירוס (Vaccine-derived Poliovirus, VDPV)?

VDPV איז א סארט פון די אפגעשוואכטע פאליאוויירוס וואס איז געווען אריינגערעכנט אין די לעבעדיגע אפגעשוואכטע וויירוס מויל וואקסין. VDPV האט זיך געטוישט איבער צייט און פירט זיך אויף מער ווי די ווילדע פאליאוויירוס. עס קען זיך גרינגערהייט פארשפרייטן צו מענטשן וואס זענען נישט וואקסינירט אנטקעגן פאליא און וואס קומען אין בארירונג מיט די פיס, שפייאכץ אדער רעספעראטארי טראפן, אזוי ווי פון א נוס, פון אן אינפעקטירטע מענטש. אזוי ווי מיט ווילדע פאליאוויירוס, VDPV קען פאראורזאכן קראנקהייט, אריינגערעכנט פאראליזירונג, אין מענטשן וואס זענען נישט וואקסינירט אנטקעגן פאליא.

וויאזוי קען מען פארמיידן פאליא?

פאליא און אירע קאמפליקאציעס קען מען פארמיידן מיט וואקסינאציע. וואקסינאציע באשיצט אנטקעגן ביידע ווילדע מיני פאליאוויירוס און VDPV. די איינציגסטע ווירקזאמע קאנטראל מיטל צו פארמיידן אינפעקציע איז צו אנהאלטן די העכסטע מעגליכע וואקסינאציע שטאפלען אין די קאמיוניטי.

וויאזוי קענען מענטשן ווערן וואקסינירט אנטקעגן פאליא?

רעדט צו אייער העלט קעיר פראוויידער אדער אייער קינד'ס פראוויידער צו באשטימען אן אפוינטמענט פאר וואקסינאציע אנטקעגן פאליא און אנדערע סכנה'דיגע קראנקהייטן, אזוי ווי מיזעלס, מאמפס, וואפינג היסן, טשיקנפאקס און COVID-19. אויב איר האט נישט א פראוויידער, רופט 311 אדער 844-692-4692 פאר הילף צו טרעפן איין — קעיר ווערט צוגעשטעלט אין ניו יארק סיטי אפגעזעהן פון אימיגראציע סטאטוס, אונשווערנס אדער מעגליכקייט צו באצאלן.

אויך, קינדער אין עלטער פון 4 יאר און עלטער קענען באקומען זייער וואקסין ביי ניו יארק סיטי העלט דעפארטמענט'ס Forte Greene Health Center אויף 295 Flatbush Ave. Ext., Fifth Floor, Brooklyn, NY פיפטע שטאק, ברוקלין, ניו יארק, פון מאנטאג ביז פרייטאג, 8:30 צופרי ביז 2:30 נאכמיטאג. צו מאכן אן אפוינטמענט, באזוכט nyc.gov און זוכט פאר "immunization clinic". (אימיניזאציע קליניק).

טוט פריערדיגע אינפעקציע מיט פאליא צושטעלן אימיניטעט?

נישט דווקא. עס זענען דא דריי מיני פאליאוויירוס — אינפעקציע מיט סיי וועלכע איין מין טוט צושטעלן אימיניטעט צו יענע מין אבער נישט צו די אנדערע צוויי מינים. פאליא איז א געפארפולע קראנקהייט און ווערן וואקסינירט איז די בעסטע באשיצונג.

וואס איז די באהאנדלונג פאר פאליא?

עס זענען נישט דא קיין ספעציפישע מעדעצינען אדער אנטיביאטיק וואס ארבעט אנטקעגן פאליא. מענטשן מיט פאליא דארפן מעדיקעל קעיר צו אדרעסירן מעגליכע קאמפליקאציעס פון די קראנקהייט און פאר ערהוילונג.

די ניו יארק סיטי העלט דעפארטמענט קען טוישן רעקאמענדאציעס ווילאנג די מצב

אנטוויקלט זיך.

7.28.22