

## COVID-19 疫苗加强针接种建议

每位 12 岁及 12 岁以上的人员都应该在符合条件后尽快接种 COVID-19 疫苗加强针，以确保他们处在最新接种状态。处在最新接种状态意味着您已经完全接种了疫苗，并且在符合条件时，也已接种了额外剂量和加强针。在美国境外接种了 COVID-19 疫苗的人士或参加了疫苗临床试验的人士也可能有资格接种加强针。

### 什么是加强针？为什么推荐接种加强针？

加强针是可提供加强保护的额外一剂疫苗。疫苗在预防 COVID-19 引起的重症、住院和死亡方面仍非常有效，但对轻度至中度病症的防护力未必同样强劲，并且可能随着时间的推移而减弱。

加强针可以为您、您的家人和您的社区提供额外保护，减少您感染 COVID-19 并将病毒传播给他人的机会，这包括因为年龄太小而不能接种疫苗的儿童，以及罹患 COVID-19 重症风险较高的人员。由于出现传染性更强的病毒变异株，接种加强针尤为重要。

### 我何时可以接种加强针？

您什么时候可以打加强针，取决于您初始接种的疫苗品牌：

- 如果您接种的是**辉瑞 (Pfizer) 或莫德纳 (Moderna) 疫苗**，可在接种完最后一剂疫苗的至少**五个月**后接种加强针。
- 如果您接种的是**强生 (Johnson & Johnson) 疫苗**，可在接种完疫苗的至少**两个月**后接种加强针。

### 加强针是否必须与我初始接种的疫苗为同一品牌？

不需要。您可以选择加强针的品牌。可能的话，建议您选择接种辉瑞或莫德纳疫苗加强针。如果您对接种哪种疫苗有疑问，请咨询您的医疗保健提供者。如果您需要人帮忙寻找医疗保健提供者，请拨打 **311**。

### 加强针的成分是否与初始剂量疫苗的成分相同？

是的。辉瑞和强生的加强针与初始剂量疫苗完全相同。莫德纳的加强针具有与初始疫苗相同的成分，但剂量小于人们接种的前两剂疫苗。

### 加强针有副作用吗？

接种加强针后可能出现副作用反应。副作用反应通常表现为轻度到中度，并持续一到三天。副作用反应包括手臂酸痛、头疼、身体酸痛、疲倦和发烧。严重副作用反应较为罕见，但接种加强针后可能出现。

### 我免疫力低下并已接种了第三剂疫苗，是否可以接种加强针？

年龄在 12 岁及 12 岁以上、免疫力中度或重度低下的人群，如果已接种了第三剂辉瑞或莫德纳疫苗，则应在接种完第三剂的至少五个月后注射加强针。如需有关第三剂疫苗的信息，请访问 [on.nyc.gov/thirddose](https://on.nyc.gov/thirddose)。

### **我在美国境外或在参与临床试验时接种了一种 COVID-19 疫苗，是否可以接种加强针？**

如果您的年龄在 12 岁及 12 岁以上，并符合以下条件，则应在接种完最后一剂疫苗的至少五个月后接种**辉瑞疫苗**加强针：

- 接种过获得世界卫生组织 (World Health Organization, WHO) 紧急使用授权、但未获美国食品药品监督管理局 (U.S. Food and Drug Administration, FDA) 授权或批准的疫苗的所有初始剂量
- 接种过任何由获 FDA 批准、FDA 授权或 WHO 授权的疫苗所构成的 COVID-19 疫苗组合的所有初始剂量
- 参加临床试验期间，接种了获 WHO 紧急使用授权、但未获 FDA 授权或批准的疫苗的所有初始剂量
- 在莫德纳疫苗的儿童临床试验中，接种了所有初始剂量

参加临床试验者所接种的必须是活性疫苗，而非安慰剂。如有任何疑问，请咨询您的医疗保健提供者。

### **我在哪里可以接种加强针？**

您可以在任何提供您所需品牌疫苗的接种站点接种加强针。您不必前往接种前两剂疫苗的另一地点。如需查找疫苗接种站点，请访问 [nyc.gov/vaccinefinder](https://nyc.gov/vaccinefinder) 并在“Any vaccine”（任何疫苗）下拉菜单中选择“Pfizer”（辉瑞）或“Moderna”（莫德纳）。您亦可致电 877-829-4692，请人帮忙查找本市营运的疫苗接种站点。如需安排免费上门接种，请访问 [nyc.gov/homevaccine](https://nyc.gov/homevaccine) 或拨打 877-829-4692。

### **我可以在接种其他疫苗（如流感疫苗）的同时接种加强针吗？**

是的。您可以在接种其他疫苗的同时，或在接种之前或之后的任何时间接种加强针。如果您尚未接种流感疫苗，请试着找到能够提供这两种疫苗的地点，如许多药店。

### **接种加强针是否免费？**

是的。如果您拥有保险，则保险公司可能会接到账单，但您不会被收取管理费或其他费用。

### **接种加强针需要提供什么材料？**

您需要出示载有您出生日期的文件，如驾照、非驾照 ID、IDNYC、出生证或护照。如果您有疫苗接种卡，请带上它。

### **我是否需要接种完加强针，才算完全接种？**

不是。您接种完双剂疫苗（如辉瑞或莫德纳）的第二剂或单剂强生疫苗之后再过两周，即被视为完全接种。然而，在您接种了加强针后，您就达到了最新疫苗接种状态。另外，某些雇主和场所可能要求符合接种资格的人员提供加强针接种证明。隔离检疫的要求也可能依据您是否接种过加强针而有所不同。