

宮頸炎

宮頸炎是指宮頸粘膜發炎（受到刺激）。宮頸是子宮末端延伸至陰道的部位。

宮頸炎可能預示著存在感染。性傳播感染 (STI)，例如衣原體和淋病均可導致宮頸炎。

症狀

患有宮頸炎的大部分人群均無症狀。一旦呈現症狀，則可能包括：

- 異常陰道分泌物
- 經期之間或在陰道性交後發現少量血點（出血）
- 陰道性交期間或之後感到疼痛



宮頸炎



預防

- 使用避孕套可以避免傳播引發宮頸炎的 STI，例如衣原體和淋病。
- 擁有多名伴侶將增加染上或傳播這類 STI 的風險。

檢測

如果您的健康照護提供者在一次盆腔（體內）檢查中看到出血或膿包，他們將使用拭子對宮頸內的液體取樣，用於檢測。

治療

您的健康照護提供者可能會為您提供治療引發宮頸炎的任何 STI 的抗生素。

治療理由

若不治療，由 STI 引發的宮頸炎可能：

- 導致嚴重疼痛或不孕不育（無法生育）
- 增加發生輸卵管妊娠（宮外孕）的風險
- 更易染上或傳播 HIV

性伴侶

如果您的宮頸炎是因為 STI 引發的，則您的性伴侶也需要接受治療，以確保他們不會患上嚴重疾病，再次感染您或他人。

如果您的 STI 檢測結果呈陽性，請將您的感染情況告知您在過去兩個月間的所有性伴侶，使其能夠接受檢查和治療。

宮頸炎和妊娠

所有妊娠人員應當在孕期盡早檢測是否有 STI，包括 HIV。妊娠期間患有 STI 可能導致新生兒的眼睛和肺部遭到感染。

紐約市性健康診所提供機密且免費或廉價服務，包括 STI 和 HIV 檢測。

如需查找一家診所，請造訪：
nyc.gov/health/clinics。