

宫颈炎

宫颈炎是指宫颈粘膜发炎(受到刺激)。宫颈是子宫末端延伸至阴道的部位。

宫颈炎可能预示着存在感染。性传播感染(STI),例如衣原体和淋病均可导致宫颈炎。

症状

患有宫颈炎的大部分人群均无症状。一旦呈现症状,则可能包括:

- 异常阴道分泌物
- 经期之间或在阴道性交后发现少量血点(出血)
- 阴道性交期间或之后感到疼痛



宫颈炎



预防

- 使用避孕套可以避免传播引发宫颈炎的 STI, 例如衣原体和淋病。
- 拥有多名伴侣将增加染上或传播这类 STI 的风险。

检测

如果您的医疗保健提供者在一次盆腔(体内)检查中看到宫颈上出血或脓包, 他们将使用拭子对宫颈内的液体取样, 用于检测。

治疗

您的医疗保健提供者可能会为您提供治疗引发宫颈炎的任何 STI 的抗生素。

治疗理由

若不治疗, 由 STI 引发的宫颈炎可能:

- 导致严重疼痛或不孕不育(无法生育)
- 增加发生输卵管妊娠(宫外孕)的风险
- 更易染上或传播 HIV

性伴侣

如果您的宫颈炎是因为 STI 引发的, 则您的性伴侣也需要接受治疗, 以确保他们不会患上严重疾病, 再次感染您或他人。

如果您的 STI 检测结果呈阳性, 请将您的感染情况告知您在过去两个月间的所有性伴侣, 使其能够接受检查和治疗。

宫颈炎和妊娠

所有妊娠人员应当在孕期尽早检测是否有 STI, 包括 HIV。妊娠期间患有 STI 可能导致新生儿的眼睛和肺部遭到感染。

纽约市性健康诊所提供机密且免费或廉价服务, 包括 STI 和 HIV 检测。

如需查找一家诊所, 请访问:
nyc.gov/health/clinics。